

INCURIN

R_x

MSD Animal Health Sweden

Tablett 1 mg

(Rund tablett med en skåra)

Östriol

Djurslag:

Hund

Aktiv substans:

Estriol

ATC-kod:

QG03CA04

FASS VET-text: *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 08/04/2024.

Innehåll

Varje tablett innehåller:

Aktiv substans:

Östriol 1 mg

Hjälpämnen:

Kvalitativ sammansättning av hjälpämnen och andra beståndsdelar
Amylopektin
Potatisstärkelse
Magnesiumstearat
Laktos

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Östriol är ett korttidsverkande, naturligt östrogen. Hos ovarieektomerade tikar har det en gynnsam effekt på urininkontinens. I säkerhetsstudien och kliniska prövningar på hund, inklusive långtidsbehandling observerades inga tecken på benmärgsdepression. Detta beror sannolikt på den korttidsverkande östrogena effekten hos östriol.

Farmakokinetiska egenskaper

Efter oral administrering absorberas östriol nästan fullständigt från mag-tarmkanalen. Nästan all östriol binds till albumin i plasma. Östriol utsöndras i konjugerad form via urinen. Efter oral administrering förekommer ingen ackumulering vid upprepade dosering.

Indikationer

Behandling av hormonberoende urininkontinens på grund av otillräcklig funktion av sfinktern hos ovariehysterektomerade tikar.

Kontraindikationer

Ska inte användas på intakta tikar, eftersom effekten bara har dokumenterats hos ovariehysterektomerade tikar.

Djur som visar ett polyuri-polydipsisyndrom skall inte behandlas med detta läkemedel.

Användning av detta läkemedel är kontraindikerad under dräktighet, laktation och till djur yngre än ett år.

Försiktighet

Vid östrogena verkningar bör dosen sänkas.

Dräktighet och laktation

Använd inte under dräktighet eller laktation.

Biverkningar

Hund (tik):

Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur):	Svullen vulva ^{1,2} , svullna mjölkkörtlar ^{1,2} , attraktivitet för hanhundar ^{1,2} , kräkningar ^{1,2}
Sällsynta (1 till 10 av 10 000 behandlade djur):	Vaginalblödning, alopecia

¹Observerats vid högsta rekommenderade dos på 2 mg per hund.

²Dessa effekter är reversibla efter dossänkning.

Det är viktigt att rapportera biverkningar. Det möjliggör
fortlöpande säkerhetsövervakning av ett läkemedel. Rapporter ska,
företrädesvis via en veterinär, skickas till antingen innehavaren av

godkännande för försäljning eller till den nationella behöriga myndigheten via det nationella rapporteringssystemet. Se även bipacksedeln för respektive kontaktuppgifter.

Dosering

Dos och administreringsätt

Endast för oral användning.

Sambandet mellan slutlig effektiv dos och kroppsvikt har inte fastställts och därför måste dosen bestämmas individuellt för varje hund.

Följande doseringsschema rekommenderas: Börja behandlingen med en tablett (1 mg östriol) dagligen. Om behandlingen har önskad effekt, sänks dosen till en halv tablett om dagen. Om den inledande behandlingen inte har önskad effekt, ökas dosen till två tabletter om dagen, given som en dos. En del hundar behöver inte daglig behandling - behandling varannan dag kan prövas när den effektiva dagliga dosen har fastställts.

Lägsta dos ska inte vara mindre än 0,5 mg per hund per dag. Säkerställ att dosen för att uppnå terapeutisk verkan är så låg som möjligt. Använd inte mer än 2 tabletter per hund per dag. Om inget svar på behandlingen uppnås, bör diagnosen omprövas för att undersöka andra orsaker till inkontinens, såsom neurologiska störningar, neoplas i urinblåsa och dylikt.

Djuren bör undersökas var 6:e månad under behandlingen.

Blandbarhet

Inga kända.

Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning

Ej relevant.

Karenstider

Ej relevant

Interaktioner

Inga kända.

Överdoser

Vid överdosering kan typiska östrogenverkningar förekomma. Dessa effekter är reversibla efter att dosen sänkts.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Höga doser östrogen kan öka risken för tumörer i organ med östrogenreceptorer (mjölkkörtlar).

Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Ej relevant.

Särskilda försiktighetsåtgärder för skydd av miljön:

Ej relevant.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Förvaring

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C.

Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använda veterinärmedicinska läkemedel och avfall

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Använd retursystem för kassering av ej använt läkemedel eller avfall från läkemedelsanvändningen i enlighet med lokala bestämmelser.

Klassificering av det veterinärmedicinska läkemedlet

Receptbelagt läkemedel.

Utförlig information om detta läkemedel finns i unionens produktdatabas (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

Förpackningsinformation

Tablett 1 mg Rund tablett med en skåra
30 styck blister, receptbelagd