

Nobilis[®] Rismavac + CA126 vet.

R_x

MSD Animal Health Sweden

Koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension

Vaccin mot Mareks sjukdom

Djurslag:

Kyckling

Aktiva substanser (i bokstavsordning):

Kalkonherpesvirus, stam FC-126, levande försvagat

Kycklingherpesvirus, stam CVI-988, levande försvagat

ATC-kod:

QI01AD03

FASS VET-text: *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2022-09-13.

Innehåll

Aktiva substanser:

1 ml koncentrat innehåller:

Levande kycklingherpesvirus, stam CVI-988 $>3,0 \log_{10}$ pfu per dos
och levande kalkonherpesvirus, stam FC-126 $>3,0 \log_{10}$ pfu per
dos.

Hjälpämne(n):

Kalvserum 0,10 ml, dimetylsulfoxid 0,075 ml

Sackaros, natriumklorid, dinatriumvätefosfatdihydrat,
enolsulfonftalein (fenolrött), kaliumdivätefosfat, vatten för
injektionsvätskor

Cellkoncentrat:

Bovint serum

Basalmedium

Dimetylsulfoxid

Spädningsvätska:

Sackaros

Natriumklorid

Dinatriumvätefosfatdihydrat

Fenolsulfonftalein (Fenolrött)

Kaliumdivätefosfat

Vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Nobilis Rismavac + CA126 är ett kombinerat levande vaccin mot
Mareks sjukdom.

Båda virus är cellassocierade och finns i en suspension av
virushaltiga embryofibroblaster från SPF ägg.

Farmakokinetiska egenskaper

-

Indikationer

Aktiv immunisering av daggamla kycklingar mot Mareks sjukdom. Indikerat vid prevalens av mycket virulenta MDV-stammar (vvMDV).

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Inga särskilda.

Dräktighet och laktation

Ej relevant.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

Dos och administreringsätt

Minst $3,0 \log_{10}$ pfu levande kycklingherpesvirus, stam CVI-988 och $3,0 \log_{10}$ pfu levande kalkonherpesvirus, stam FC-126, per daggammal kyckling, motsvarande 0,2 ml efter rekonstitution med spädningsvätskan (se Förvaring).
Ges subkutant i nacken eller intramuskulärt i låret.

När det upplösta vaccinet inte används omedelbart skall det förvaras i isbad och skvalpas om med jämna mellanrum. Upplöst vaccin ska användas inom 2 timmar.

Blandbarhet

Karenstider

Karenstid: Slakt: Noll dygn.

Interaktioner

Skyddseffekten reduceras vid samtidig vaccination mot Rheovirusinfektion.

Överdosing

Inga symptom vid 10 gånger överdos.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.

Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vaccinatören bör vara uppmärksam på säkerhetsreglerna för hantering av flytande kväve och material vid mycket låg temperatur. Ampullerna kan explodera vid plötsliga temperatursvängningar. Därför bör vaccinatören använda handskar och ansiktsmask.

Hållbarhet

Vaccin:

4 år.

Hållbarhet efter spädning: 2 timmar vid 2-8°C.

Spädningsvätska:

Glasflaska, polyetenpåse: 3 år

Påse av flerskiktsplast: 2 år

Förvaring

Särskilda förvaringsanvisningar

Cellkoncentrat:

Förvaras och transporteras i djupfryst tillstånd i flytande kväve (-196 °C).

Spädningsvätska:

Förvaras under 30 °C.

Kvävebehållare:Förvara behållaren med flytande kväve i säkrat, upprätt läge i ett rent, torrt och välventilerat rum, som är avskilt från kläcknings-/kycklingrummet i kläckeriet.

Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använda veterinärmedicinska läkemedel och avfall

Desinficera oanvända produkter och förstör överblivet vaccin som varit upplöst mer än två timmar genom bränning eller kokning.

Förpackningsinformation

Koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension

1000 dos(er) ampull, receptbelagd