

Bipacksedel: Information till användaren

Fluorin Mint

0,2% munsköljvätska
natriumfluorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din tandläkare/läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till tandläkare/läkare, tandhygienist eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med tandläkare/läkare, tandhygienist eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Fluorin Mint är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fluorin Mint
3. Hur du använder Fluorin Mint
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fluorin Mint ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fluorin Mint är och vad det används för

Fluorin Mint används som kariesförebyggande behandling för barn över 12 år och vuxna med ökad risk för karies (hål i tänderna) bl a vid muntorrhet (t ex vid behandling med vissa läkemedel), delprotes eller fastsittande tandställning eller efter rekommendation av tandläkare/läkare eller tandhygienist. En grundläggande åtgärd för att förebygga karies är användning av fluortandkräm.

Natriumfluorid som finns i Fluorin Mint kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Fluorin Mint

Använd inte Fluorin Mint

- om du är allergisk mot natriumfluorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Lösningen ska inte sväljas p g a risk för oönskade långtidseffekter som t ex fluoros (emaljskada), särskilt hos barn. När läkemedlet används av barn i yngre skolålder rekommenderas att vuxen säkerställer att lösningen spottas ut.

Om 10 ml lösning sväljs vid enstaka tillfälle är mängden fluor så liten att det inte är risk för förgiftning.

Barn

Till barn under 12 år endast efter rekommendation av tandläkare.

Graviditet och amning

Inga risker att använda Fluorin Mint under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan

Fluorin Mint innehåller konserveringsmedel

Fluorin Mint innehåller konserveringsmedel E 218 (metylparahydroxibensoat) som kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

3. Hur du använder Fluorin Mint

Använd alltid detta läkemedel enligt tandläkarens/läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga tandläkare/läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

Vuxna med förhöjd kariesrisk: 10 ml Fluorin Mint fluorlösning 1-2 gånger dagligen.

Användning för barn

Barn över 12 år med förhöjd kariesrisk: 10 ml Fluorin Mint fluorlösning 1-2 gånger dagligen.

Till barn under 12 år endast efter rekommendation av tandläkare.

Vätskan tas i munnen och får sila mellan tänderna i 1 minut och spottas sedan ut. Man bör därefter inte skölja munnen eller äta inom den närmaste halvtimmen.

Lösningen ska inte sväljas. Om 10 ml lösning ändå sväljs är mängden fluor så liten att det inte är risk för förgiftning.

Om du använt för stor mängd av Fluorin Mint

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att använda Fluorin Mint och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg
- svårigheter att svälja
- nässelutslag och andningssvårigheter

Det kan vara tecken på angioödem, som är en *mycket sällsynt biverkning (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)*.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Hudutslag och inflammation i munnen (kan ge symtom som brännande och stickande känsla i munnen och på tungan samt svullna läppar).

Vid oavsiktlig nedsvaljning av Fluorin Mint kan kortvarigt illamående uppstå.

5. Hur Fluorin Mint ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat.: Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Öppnad förpackning är hållbar i 6 månader.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är natriumfluorid 2 mg/ml.
- Övriga innehållsämnen är konserveringsmedel E 218 (metylparahydroxibensoat) 1,5 mg/ml, makrogollauryleter, pepparmyntolja (smakämne), xylitol (sötningsmedel) och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, färglös vattenlösning med smak av mint. Receptfri förpackning: 500 ml Receptbelagd förpackning: 1000 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

Unimedic Pharma AB
Stockholm

Tillverkare
Unimedic

Matfors

Denna bipacksedel ändrades senast 2023-08-21