



OM DIN BEHANDLING

Du har ordinerats Lixiana, ett blodförtunnande läkemedel, som förtunnar ditt blod och bidrar till att förhindra att du får blodproppar. Det är viktigt att du tar ditt läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar.

- Om du missar en dos ska du ta den omedelbart och sedan fortsätta följande dag som vanligt – ta inte dubbel ordinerad dos samma dag.
- Börja inte ta andra läkemedel (däribland receptfria) utan att rådfråga läkare.

- Sluta inte att ta Lixiana utan att rådfråga läkare, eftersom det kan öka risken för att du får en blodpropp.
- Läs bipacksedeln som finns i varje förpackning med Lixiana.

NÄR DU SKA SÖKA LÄKARE

RISK FÖR BLÖDNING

När du tar ett blodförtunnande läkemedel såsom Lixiana kan risken för blödning öka. Det är därför viktigt att du är uppmärksam på eventuella tecken och symtom på blödning och att du **omedelbart** talar med läkare om du får något av följande:

- blåmärken eller blödning under huden
- blod i urinen
- upphostning av blod
- uppkräkning av blod eller material som ser ut som kaffesump

- näsblod eller sår som tar lång tid att sluta blöda
 - svartfärgad avföring
 - yrsel eller plötslig huvudvärk
 - oförklarlig trötthet
 - onormal blödning från slidan, däribland kraftigare eller långvariga menstruationer
- Tala med läkare om du får några ovanliga symtom.

PATIENTKORT

Lixiana®
filmdragerade tabletter
edoxaban

Ha alltid detta kort med dig.

Visa det för hälso- och sjukvårdspersonal, apotekspersonal, kirurg eller tandläkare före medicinsk behandling eller operation.

MSD-Y2(SE) 118644



↑
Riv av denna del

49 mm

50 mm

51 mm

53 mm

52 mm

Daiichi-Sankyo

Daiichi Sankyo Europe GmbH
Text & Design Management
Luitpoldstraße 1
D-85276 Pfaffenhofen

Format [mm]: 255 x 97 (Endformat 53 x 97) Außen

Produkt: PAC LIXIANA 15+30+60 FT

Material: MSD-Y2(SE) 118644


Laetus Code: 307


Druckfarben: Schwarz, PANTONE 233 C

Master Stand: 20.10.2015/Le

Datum: 27.04.2020 - 11:32

Korrekturabzug
PROOF

76 mm	PATIENTINFORMATION	BEHANDLINGSINFORMATION (Ifylls av läkare)	FÖRSKRIVARINFORMATION	INFORMATION FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Koagulationstester såsom internationell normaliserad kvot (INR), protrombintid (PT) eller aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT) är inte användbara mått på effekten av Lixiana. En kalibrerad anti-faktor Xa-analys kan bidra med information inför kliniska beslut. <p>Se produktresumén för mer information.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>
	Patientens namn:	Lixiana har ordinerats i en dos på: mg en gång dagligen	För mer information eller vid nödsituation, kontakta: Läkarens namn:	<ul style="list-style-type: none"> • Lixiana är ett oralt antikoagulans som är en faktor Xa-hämmare. • När det behövs en invasiv åtgärd ska Lixiana sättas ut minst 24 timmar före och lämplig försiktighet iakttas. • Lixiana kan öka blödningsrisken. Vid kliniskt signifikant blödning avbryts behandlingen omedelbart. 	
	Födelsedatum:	Började den: / (mm/åå)	Telefonnummer, praktikens stämpel:		
	I nödsituation, kontakta:	Blodgrupp:	Läkares namnteckning:		
	Namn:	Andra läkemedel/tillstånd:			
Telefonnummer:				
21 mm	52 mm	53 mm	51 mm	50 mm	49 mm

 Daiichi Sankyo Europe GmbH Text & Design Management Luitpoldstraße 1 D-85276 Pfaffenhofen	Format [mm]:	255 x 97 (Endformat 53 x 97)	Innen
	Produkt:	PAC LIXIANA 15+30+60 FT	
	Material:	MSD-Y2(SE) 118644	
	Druckfarben:	Schwarz, PANTONE 233 C	
	Datum:	27.04.2020 - 11:32	