

Titreringsfas

UPTRAVI®
filmdragerade tabletter
selexipag

Målsättningen med titreringen är att uppnå den individuellt anpassade dosen för varje patient. Detta sker vanligtvis inom 8 veckor.



200-mikrogramstablett



800-mikrogramstablett

Titreringsförpackning*

Börja med 200 mikrogram två gånger dagligen med 12 timmars intervall. För att minska risken för biverkningar, ta tabletterna tillsammans med mat. Ta första tabletten på kvällen.

Reducera antalet administrerade tabletter†

Om det krävs en dos högre än 800 mikrogram, kan patienten ges:

Ytterligare en titreringsförpackning Uptravi 200 mikrogram

En förpackning Uptravi 800-mikrogramstabletter

Upptitrering

Öka dosen med 200 mikrogram två gånger dagligen. Varje doseringssteg varar ca 1 vecka, men kan ta längre tid. Den första dosen i varje steg ska tas på kvällen.

Uppföljning

Öka dosen tills biverkningar som inte kan tolereras, eller hanteras medicinskt, uppstår[§].

Nedtrappning

Om en patient uppnår en dos som inte kan tolereras, reducera dosen till den föregående nivån.

Högsta dos

1600 mikrogram 2 gånger dagligen är den högsta dosen en patient ska ges.

Underhållsfas

Den högsta tolererade dosen blir den individuella underhållsdosen och kan ersättas med en enda tablett med motsvarande styrka, två gånger dagligen. Denna dos ska aldrig överstiga 1600 mikrogram två gånger dagligen.

Tabletterna motsvarar inte verklig storlek.

*Titreringsförpackningen innehåller 140 st Uptravi 200 mikrogram filmdragerade tabletter. Detta är tillräckligt för att titrera upp till 800 mikrogram.

†De två förpackningarna innehåller tillräckligt med tabletter för att titrera upp till 1600 mikrogram.

§De vanligast förekommande biverkningarna dina patienter kan uppleva under behandling med Uptravi är huvudvärk, diarré, illamående och kräkningar, käksmärta, myalgi, smärta i armar och ben, artralgi och ansiktsrodnad. För en fullständig lista över biverkningar, vänligen läs produktresumén för mer information.

För dosering, doseringsjustering samt ytterligare information, vänligen läs den fullständiga produktresumén.

Inledning av behandling

Behandling med Uptravi ska endast inledas och övervakas av läkare med erfarenhet av att behandla PAH.

Patientens titreringsförpackning innehåller:

- Uptravi 200 mikrogram filmdragerade tabletter.
- En titreringsguide för patienter som inkluderar en förklaring till titreringsprocessen och en dagbok för att notera det dagliga tablettintaget.
 - Vid inledning av behandling, gå igenom titreringsguiden tillsammans med patienten för att säkerställa att de förstår processen och är förberedda om de skulle uppleva biverkningar.

OBS: För att reducera antalet administrerade tabletter; om en dos högre än 800 mikrogram krävs, kan patienten ges ytterligare en titreringsförpackning med 200-mikrogramstabletter och en förpackning med 800-mikrogramstabletter.

Kommunikation med patienten

- Kontakta din patient varje vecka under titreringsperioden för att diskutera deras framsteg och för att säkerställa att varje farmakologisk biverkan behandlas effektivt.
- De vanligast förekommande biverkningar som är relaterade till Uptravis verkningsmekanism är till exempel huvudvärk, diarré, käksmärta, illamående, myalgi, kräkningar, smärta i armar och ben, ansiktsrodnad och artralgi. Dessa uppkommer särskilt under den individualiserade dositeringen.
- Förväntade farmakologiska biverkningar är vanligtvis övergående eller kan hanteras med symtomatisk behandling.
- I klinisk praxis har man observerat att biverkningar i magtarmkanalen svarat på läkemedel mot diarré, kräkning respektive illamående och/eller läkemedel mot funktionella rubbningar i magtarmkanalen. Biverkningar som involverar smärta har ofta behandlats med analgetika (t.ex. paracetamol).

Underhållsfas

- När underhållsdosen har uppnåtts, kan en enda tablett med motsvarande styrka förskrivas (tabletter på 200–1600 mikrogram finns tillgängliga).
- Detta möjliggör att patienten kan ta en tablett på morgonen och en på kvällen.
- Alla patienter är olika och alla kommer inte att sluta på samma underhållsdos. Ingen dos ska överskrida 1600 mikrogram två gånger dagligen.

Tabletterna för underhållsdosen kommer att skilja sig i färg och ha siffror som visar styrkan (i hundratals mikrogram) präglade på ytan.