

Schema för leverfunktionstester med agomelatin

Godkänd indikation: Behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna

☐ Agomelatin 25 mg

☐ Före start av 25mg ALATµkat/l
 ASATµkat/l

☐ Vecka 3 ALATµkat/l
 ASATµkat/l

☐ Vecka 6 ALATµkat/l
 ASATµkat/l

☐ Vecka 12 ALATµkat/l
 ASATµkat/l

☐ Vecka 24 ALATµkat/l
 ASATµkat/l

Utför ett test närhelst kliniskt indicerat.

☐ I händelse av dosökning **till 50mg**,
återupprepa testschemat.

☐ Insättande av 50mg ALATµkat/l
 ASATµkat/l

☐ Vecka 3 ALATµkat/l
 ASATµkat/l

☐ Vecka 6 ALATµkat/l
 ASATµkat/l

☐ Vecka 12 ALATµkat/l
 ASATµkat/l

☐ Vecka 24 ALATµkat/l
 ASATµkat/l

Utför ett test närhelst kliniskt indicerat.

Patientens namn:

Datum för behandlingsstart:

**Symptom eller tecken på
potentiell leverskada***

Serumtransaminaser (ALAT, ASAT)

ALAT och/eller ASAT > 3
ggr den övre gränsen
för normalvärdet

ALAT och/eller ASAT
≤ 3 ggr den övre
gränsen för
normalvärdet

Normalvärde

**Symptom eller tecken på
potentiell leverskada***

Inga symptom eller tecken på potentiell leverskada
Upprepa leverfunktionstester inom 48 timmar

ALAT och/eller ASAT > 3 ggr den övre
gränsen för normalvärdet

ALAT och/eller ASAT
≤ 3 ggr den övre gränsen för normalvärdet



Avbryt behandlingen

Leverfunktionstester
(inklusive transaminaser)
ska utföras



Avbryt behandlingen

Utför regelbundet
leverfunktionstester tills
serumtransaminaserna
återgår till det normala



Fortsätt behandlingen

Följ tidsschemat för leverfunktionstester

*Tecken som mörk urin, kittfärgad avföring, gul hud och/eller ögonvitor, buksmärta i övre högra kvadranten, ihållande, nyuppkommen och/eller oförklarlig trötthet.