



**Till dig som behandlas med Xarelto®
och ska genomgå konvertering**

Patientinformation
www.xarelto-patient.se

Konvertering – en behandling som syftar till att försöka återställa ditt hjärtas normala hjärtrytm




När hjärtat tappat takten

Du har fått diagnosen förmaksflimmer och är nu planerad för att genomgå konvertering, en behandling som syftar till att försöka återställa ditt hjärtas normala hjärtrytm. Det finns två olika typer av konvertering, elkonvertering och farmakologisk konvertering. Det vanligaste tillvägagångssättet är elkonvertering. Inför konverteringen har du påbörjat läkemedels-behandling med Xarelto.



Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår oregelbundet. Tillståndet orsakas av att den elektriska impulsöverföringen – från sinus-knutan till hjärtats förmak – inte fungerar som den ska.

I normala fall ska båda förmaken dra ihop sig samtidigt, och fylla på blod i kamrarna samtidigt, men vid förmaksflimmer uppstår elektriska impulser på flera ställen i förmaken vilket leder till att de drar ihop sig oregelbundet. Det leder till att blodflödet ut i kamrarna, och sedan ut i kroppen, blir ineffektivt. Ett tillstånd som kan avläsas och upplevas som att pulsen blir svag, oregelbunden eller mycket snabb.



Orytmiskt hjärta – risk för stroke

Vid förmaksflimmer kan det försämrade blodflödet leda till att en del av blodet blir kvar i förmaken, vilket innebär en ökad risk för proppbildning. Vid konverteringen återställs den normala hjärtrytmen. En behandling som förenklat kan beskrivas som när man "startar om" ett urladdat bilbatteri med hjälp av startkablar. Konverteringen kommer att synka hjärtats elektriska impulser och få blodet att flyta normalt genom förmaken.



OM DET HAR FUNNITS SMÅ BLODPROPPAR I HJÄRTAT FINNS NU EN RISK FÖR ATT DESSA ÅKER MED BLODSTRÖMMEN UT I KROPPEN, OCH DET KAN ORSAKA STROKE.



Risken för stroke minskar kraftigt om man inför konvertering får läkemedelsbehandling med blodförtunnande mediciner

Innan konverteringen

Risken för stroke minskar kraftigt om man inför konvertering får läkemedelsbehandling med blodförtunnande mediciner, så kallade antikoagulantia, i minst tre veckor. Det är därför du har fått det receptbelagda läkemedlet Xarelto.

Xarelto är en blodförtunnande medicin som minskar blodets förmåga att levera sig vilket ger ett skydd mot bildandet av blodproppar.

För att Xarelto ska ha den effekt som är avsedd är det dock mycket viktigt att du tar tabletten varje dag som ordinerat.

Så tas Xarelto

Du ska ta tabletten en gång om dagen. Försök att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag så blir det lättare att komma ihåg. Det är viktigt att Xarelto tas tillsammans med mat för att ge ett så bra skydd som möjligt. Om du missar en tablett finns risk för att skyddseffekten är otillräcklig och att en stroke kan uppstå i anslutning till konverteringen.

**Vill du ha en påminnelse varje dag per sms?
Gå in och registrera dig på www.xarelto-patient.se**



Efter konverteringen

Det mycket viktigt att du fortsätter att ta Xarelto även efter konverteringen eftersom den ökade risken för stroke kvarstår de fyra första veckorna efter ingreppet.

Behandlingstidens längd är individuell och avgörs av din läkare efter genomgång av din sjukhistoria. Sluta inte att ta Xarelto utan att först tala med din läkare eftersom risken för blodpropp då ökar!

Biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Halsband

Du kommer att få ett halsband som du rekommenderas bära för din egen säkerhet. Om en olycka skulle inträffa ser man då att du tar blodförtunnande medicin. Det är viktigt att du har brickan för Xarelto, och inte använder en bricka för någon annan blodförtunnande behandling. Om du skulle ha behov av en bricka helt i plast är du välkommen att ringa till Bayer AB: 08-580 223 00, eller maila: order.scandinavia@bayer.com

Tablett-schema gör det enklare

Skulle du missa någon tablett är det viktigt att du kontaktar din läkare och informerar om detta.

Om du genomför konverteringen utan att informera om någon missad tablett utsätter du dig för risken att få en stroke. För att underlätta för dig själv och din läkare att säkerställa att du har tagit alla tabletter som ordinerat bör du göra följande två saker:



Kryssa för i schemat på nästa sida varje dag när du har tagit Xarelto-tabletten



Tag med din Xarelto-kalenderblisterförpackning som visar att alla tabletter har tagits enligt ordination

Din läkare ska dessutom informera dig om Xarelto-behandlingen och du ska få patientkort och halsband. Om du inte har fått dessa, säg till din läkare eller sjuksköterska.

Har du frågor om Xarelto®?

Prata med din läkare eller sjuksköterska på mottagningen som sköter din behandling.

Namn:

Personnummer:

Markera i schemat med kryss varje dag när du tagit tabletten

Vecka/Datum (v dd/mm)	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag

Markera datum för start på behandlingen samt planerad konvertering i ovanstående schema. Medtag schema och Xarelto-kalenderblisterförpackning till konverteringen.

Återbesök/kontakt till mottagningen efter konverteringen är planerat den:

Där kommer du erhålla besked av din läkare om fortsatt behandling.

Innan du påbörjar din behandling med Xarelto, ta noga del av informationen i bipacksedeln.



Bayer

Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00