

Information till dig som har ordinerats Airomir® (salbutamol)

Du har fått denna information av din läkare/sjuksköterska.

Teva Sweden AB vill förtydliga den skillnad som finns mellan olika beredningsformer av Airomir. Vid användning av en andningsbehållare (även kallad spacer) ska **inte** Airomir Autohaler eller Airomir lösning för nebulisator användas. Tillsammans med andningsbehållare/spacer ska **endast** Airomir användas.

Instruktionsfilmer hittar du på www.fass.se under fliken "Tips för användning".

Det finns idag tre olika beredningsformer av Airomir i Sverige

- 1) **Airomir 0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension (Vnr 158883)**
 Detta är en spray (pMDI) där man genom att trycka ned metallbehållaren avfyrar en dos. Airomir kan används tillsammans med en andningsbehållare/spacer som skrivs ut via hjälpmedelskort. Exempel på andningsbehållare är AeroChamber, Vortex, OptiChamber m.fl.
- 2) **Airomir Autohaler 0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension (Vnr 158872)**
 Detta är en inandningsstyrd inhalationsspray, d.v.s. när patienten andas in långsamt och djupt genom munstycket så avfyras dosen. Airomir Autohaler ska **inte** användas tillsammans med andningsbehållare/spacer då detta medför ingen eller felaktig avfyrad dos.
- 3) **Airomir 1 mg/ml (Vnr 462037) eller 2 mg/ml (Vnr 072639) lösning för nebulisator**
 Denna beredningsform ska enbart användas tillsammans med en nebulisator och **inte** tillsammans med andningsbehållare/spacer. Observera att en nebulisator inte är samma sak som en andningsbehållare/spacer. En nebulisator omvandlar lösningen till finfördelade vätskedroppar som sedan andas in.



För fullständig information se www.fass.se eller bipacksedel i förpackningen

Airomir® (salbutamol). Lösning för nebulisator. Receptbelagt läkemedel. Användning: Airomir används för att behandla svår astma och långvarig bronkospasm som inte svarar på annan behandling. **Varningar och försiktighet:** Undvik att låta lösningen eller dimma komma in i ögonen. Kontakta din läkare om du tror att effekten av Airomir lösning för nebulisator är för svag eller för stark. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan bli gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. **Läs bipacksedeln noga.**

Airomir® (salbutamol) Inhalationsspray. Receptbelagt läkemedel. Användning: Airomir används för symtomlindring vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Observera att läkemedlet i första hand skall användas för att lindra akuta besvär. **Varningar och försiktighet:** Om astmabesvären tilltar eller om effekten av Airomir försämras, ska man omedelbart kontakta läkare. Upprepade inhalationer som inte ger effekt vid svåra astmaanfall kan betyda att annan behandling behövs. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. **Läs bipacksedeln noga.**

Airomir® Autohaler® (salbutamol) Inandningsstyrd inhalationsspray. Receptbelagt läkemedel. Användning: Airomir Autohaler används för symtomlindring vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Observera att läkemedlet i första hand skall användas för att lindra akuta besvär hos vuxna och barn från 4 år. **Varningar och försiktighet:** Om astmabesvären tilltar eller om effekten av Airomir Autohaler försämras, ska man omedelbart kontakta läkare. Upprepade inhalationer som inte ger effekt vid svåra astmaanfall kan betyda att annan behandling behövs. Autohaler skall inte användas tillsammans med en s.k. spacer (andningsbehållare). Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. **Läs bipacksedeln noga.**