

Säkerhetsinformation till patienter.
Ha alltid detta kort med dig.

Patientkort

Viktig säkerhetsinformation för akutvårdspersonal

Tolvaptan kan orsaka leverskada. Leverfunktionstester måste utföras regelbundet (varje månad de första 18 månaderna, sedan var 3:e månad). Vid tecken på leverskada eller onormal förhöjning av ALAT och ASAT skall behandling med tolvaptan omedelbart avslutas.

Tolvaptan kan leda till en ökad urinering vilket kan orsaka svår uttorkning och vätskeförlust. Symptom på uttorkning kan omfatta ökad törst, muntorrhet, trötthet, minskad urinproduktion, huvudvärk, torr hud, yrsel, ökad hjärtrytm, förvirring och försämrad hudelasticitet.

Det finns mer information på www.fass.se.

Patientens namn:

Datum då tolvaptan förskrevs första gången:

Läkarens namn:

Sjukhus respektive klinikens namn:

Kontaktnummer till kliniken:

Viktig säkerhetsinformation för patienter

Tolvaptan kan påverka hur levern fungerar.

Vänd dig till din läkare om du får symtom som trötthet, förlorad aptit, smärta i buken, feber, mörk urin, gul hud/gula ögon (gulsot), svår uttorkning, illamående, kräkning, klåda eller led- och muskelsmärta med feber.

Tolvaptan kan orsaka svår uttorkning.

Drick mycket vätska för att undvika uttorkning och vätskeförlust, och vänd dig till din läkare om du inte kan dricka vätska.