

Säkerhetsinformation till patienter.  
Ha alltid detta kort med dig.

# Patientkort

## Viktig säkerhetsinformation för akutvårdspersonal

**Jinarc® kan orsaka leverskada.** Leverfunktionstester måste utföras regelbundet (varje månad de första 18 månaderna, sedan var 3:e månad). Vid tecken på leverskada eller onormal förhöjning av ALAT och ASAT skall behandling med Jinarc® omedelbart avslutas.

**Jinarc® kan leda till en ökad urinerings vilket kan orsaka svår uttorkning och vätskeförlust.** Symptom på uttorkning kan omfatta ökad törst, muntorrhet, trötthet, minskad urinproduktion, huvudvärk, torr hud, yrsel, ökad hjärtrytm, förvirring och försämrad hudelasticitet.

Det finns mer information på [www.fass.se](http://www.fass.se).

Patientens namn:

---

Datum då Jinarc® förskrevs första gången:

---

Läkarens namn:

---

Sjukhus respektive kliniken namn:

---

Kontaktnummer till kliniken:

---

## Viktig säkerhetsinformation för patienter

### **Jinarc® kan påverka hur levern fungerar.**

Vänd dig till din läkare om du får symtom som trötthet, förlorad aptit, smärta i buken, feber, mörk urin, gul hud/gula ögon (gulsot), svår uttorkning, illamående, kräkning, klåda eller led- och muskelsmärta med feber.

### **Jinarc® kan orsaka svår uttorkning.**

Drick mycket vätska för att undvika uttorkning och vätskeförlust, och vänd dig till din läkare om du inte kan dricka vätska.