

Vad bör jag veta om Xarelto?

- ♦ Xarelto gör blodet tunnare, vilket förhindrar bildning av farliga blodproppar.
- ♦ Xarelto måste tas exakt så som läkaren ordinerat. För att få ett optimalt skydd mot blodproppar **ska du aldrig hoppa över att ge barnet/ta en dos.**
- ♦ Du ska inte sluta ge/ta Xarelto utan att först tala med läkaren, eftersom risken för blodproppar kan öka.

- ♦ Tala om för vårdpersonal om barnet/du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, innan behandling med Xarelto påbörjas.
- ♦ Tala om för vårdpersonal att barnet/du tar Xarelto innan kirurgi eller andra ingrepp.

När ska jag be om råd från en läkare?

När man tar blodförtunnande medel som Xarelto är det viktigt att känna till eventuella biverkningar. Blödningar är den vanligaste biverkningen. Påbörja inte behandling till barnet med/ta inte Xarelto

om du vet att barnet/du har risk för blödningar, utan att först diskutera detta med läkaren. Tala genast om för läkaren om barnet/du har fått några tecken eller symtom på blödning enligt nedan:

- ♦ smärta
- ♦ svullnad eller obehag
- ♦ huvudvärk, yrsel eller svaghet
- ♦ ovanligt många blåmärken, näsblödning, blödningar från tandköttet eller från sår som tar lång tid att sluta blöda
- ♦ menstruation eller vaginal blödning som är kraftigare än normalt
- ♦ blod i urinen som kan vara rosa- eller brunfärgad, röd eller svart avföring

- ♦ upphostningar med blod, eller kräkningar med blod eller kaffesumpsliknande kräkningar.

Hur ger jag barnet Xarelto?/ Hur ska jag ta Xarelto?

- ♦ För att få ett optimalt skydd, ska Xarelto 1 mg/ml ges/tas med matning (bröstmjolk eller välling) eller tillsammans med mat.
- Det kan administreras via en nasogastrisk sond eller en näringssond.

88033914

SV

Patientkort



Xarelto® 1 mg/ml,
granulat till oral
suspension

Information till vårdnadshavare/
patienter:

- ♦ Bär alltid detta kort med dig
- ♦ Visa kortet för läkare eller tandläkare innan varje behandling av patienten

Titta på instruktionsfilmen
som visar hur du bereder
och tar/ger den orala
suspensionen.



go.bayer.com/junior

**Patienten som är under antikoagulationsbehandling
med Xarelto (rivaroxaban).**

Namn: _____	Andra läkemedel / medicinska tillstånd: _____
Adress: _____	_____
_____	_____
_____	_____
Födelsedatum: _____	Vikt: _____

**I akuta situationer,
vänligen kontakta:**

Läkarens namn: _____

Läkarens telefonnummer: _____

Läkarens stämpel: _____

Vänligen kontakta också:

Namn: _____

Telefonnummer: _____

Relation: _____

**Information för
vårdpersonal:**

♦ INR-test ska inte användas eftersom det inte är ett tillförlitligt mått på den antikoagulatoriska aktiviteten hos Xarelto.

