



Loggbok för Infusion av Fabrazyme® i Hemmet


Fabrazyme®
agalsidase beta

Rutinerna som presenteras i detta dokument är en allmän vägledning men är underkastade lokal medicinsk praxis och nationellt regelverk.

Kontaktuppgifter (fylls i av behandlande läkare)

Nödnummer – SOS alarm:

Patient

Namn:	
Födelsedatum:	
Adress:	
Postnr/Postort:	
Telefon:	

Anhörigvårdare

Namn:	
Adress:	
Postnr/Postort:	
Telefon:	

Apotek

Namn:	
Adress:	
Postnr/Postort:	
Telefon:	

Behandlande läkare

Namn:	
Sjukhus:	
Adress:	
Postnr/Postort:	
Telefon:	
Nödnummer:	

Sjuksköterska

Namn:	
Organisation:	
Adress:	
Postnr/Postort:	
Telefon:	

Administreringsinformation (fylls i av behandlande läkare)

Fabrazyme har administrerats sedan:	(DD-MM-YYYY):
Första infusionen i hemmet:	(DD-MM-YYYY):

Dosregim för Fabrazyme

Dos:	
Frekvens:	
Infusionshastighet:	
Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Totalvolym i infusionspåse (ml):	
Förmedicinering (om tillämpligt):	
Skäl till infusion av Fabrazyme i hemmet:	
Noteringar och åtgärder från den första intervjun:	
Ange vilket stöd infusionssköterskan kan ge i hemmet:	

Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion

(fylls i av behandlande läkare)

1. Stoppa infusionen

2. Kontakta SOS alarm

Telefonnummer:	
----------------	--

3. Kontakta läkaren

Telefonnummer:	
----------------	--

Telefonnummer (hela dygnet):	
------------------------------	--

Läkarens namn:	
----------------	--

Klinikens namn:	
-----------------	--

Infusionspåsens totalvolym (ml):	
----------------------------------	--

Adress:	
---------	--

4. Akutmedicin

Behandling, inklusive dosering:	
---------------------------------	--

5. Den kontaktperson till patienten, som ska kontaktas

Namn:	
-------	--

Telefon:	
----------	--

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patientens allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patients allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patients allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patients allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patients allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patients allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patientens allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patients allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patients allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patients allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patientens allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patients allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patients allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patients allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patients allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patientens allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patientens allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patientens allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patientens allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patients allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patientens allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patientens allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Complete this form for every infusion session

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patients allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patients allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Fyll i detta formulär vid varje infusionstillfälle

- Patienten och/eller anhörigvårdaren har blivit informerad om associerade risker vid heminfusion av Fabrazyme och fått lämplig utbildning om hur man använder akutläkemedel.
- Vid infusionsframkallad reaktion **måste infusionen avbrytas omedelbart**
- Nödvändiga åtgärder vid allvarlig infusionsframkallad reaktion, t.ex. **kontaktinformation vid akuta lägen**, finns i loggboken. Förvara denna information lätt åtkomlig under infusionen.

Dos

Önskad rekonstituerad volym (ml):	
Antal flaskor som används:	5 mg flaskor:
	35 mg flaskor:
Administreringens varaktighet:	
Administreringshastighet:	
Eventuella problem/anmärkningar avseende infusionen (t.ex. infusionsframkallade reaktioner, vidtagen åtgärd och resultat):	
Patients allmänna hälsostatus – Beskriv alla eventuella nya hälsoproblem som du har fått före infusionen:	

Namn på person som är ansvarig för infusionen

Infusionsdatum:	(DD-MM-ÅÅÅÅ):
Sköterska:	
Anhörigvårdare (om annan än ovanstående):	

Anteckningar

Anteckningar



Utbildningsmaterial, version 2.1, oktober 2023
VV-PV-0533225