

Kan orsaka vissa allvarliga biverkningar som i vissa fall kan vara livshotande och leda till döden. Dessa kan uppstå när som helst under behandlingen och även efter avslutad behandling. Du kan få mer än en biverkning på samma gång.

Kontakta omedelbart din läkare om du upplever något tecken på biverkning eller annat symptom, även sådana som inte finns nämnda på detta kort. Din läkare kan ordinera andra läkemedel för att förhindra allvarligare komplikationer och lindra symtomen. Din läkare kan behöva senarelägga nästa behandlingstillfälle med KEYTRUDA eller avbryta behandlingen med KEYTRUDA.

Lungor

- Andnöd
- Smärta i bröstet
- Hosta

Tarmar

- Diarré eller tätare tarmtömningar än normalt
- Svart tjärliknande, klibbig avföring eller avföring med blod eller slem
- Kraftig magsmärta eller ömmande mage
- Illamående eller kräkning

Lever

- Illamående eller kräkning
- Minskad aptit
- Smärta på höger sida av magen
- Gulfärgad hud eller gula ögonvitor
- Mörk urin
- Större benägenhet att få blödningar eller blåmärken än normalt

Njurar

- Förändringar i mängden eller färgen på din urin

Typ 1-diabetes, inklusive diabetisk ketoacidosis

- Ökad aptit eller törst
- Behov av att kissa oftare
- Viktminskning
- Trötthetskänsla eller sjukdomskänsla
- Ont i magen
- Snabb och djup andning
- Förvirring
- Ovanlig dåsighet
- En andedräkt som doftar sött
- En söt eller metallisk smak i munnen
- Ovanlig lukt från urin eller svett

Hormonkörtlar

- Hjärtklappning
- Viktminskning eller viktökning
- Ökad svettning
- Håravfall
- Köldkänsla
- Förstopning
- Djupare röst
- Muskelsmärter
- Yrsel eller svimning
- Huvudvärk som inte försvinner eller ovanlig huvudvärk

VIKTIGT

- Du uppmanas att inte försöka behandla biverkningar eller symptom på egen hand.
- Sluta inte din behandling med KEYTRUDA om du inte först har diskuterat det med din läkare.
- **Ta alltid med dig detta kort**, särskilt när du reser, när du måste besöka akutmottagningen eller träffa en annan läkare än din ordinarie.
- Var noga med att informera all hälso- och sjukvårdspersonal du möter om att du behandlas med KEYTRUDA och att alltid visa upp detta kort för dem.

- **Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.**
- **Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.**

Viktig kontaktinformation

Mitt namn

Mitt telefonnummer

Närmast anhörig (namn och telefonnummer)

Behandlande läkarens namn

Telefonnummer mottagningen

Telefonnummer utanför kontorstid

Viktig information till hälso- och sjukvårdspersonal

Denna patient behandlas med KEYTRUDA (*pembrolizumab*), som kan orsaka immunmedierade biverkningar som kan uppstå när som helst under behandlingen och även efter avslutad behandling. Utvärdera patienter med avseende på tecken och symtom på immunmedierade biverkningar. Tidig diagnos och hantering är avgörande för att minimera eventuella konsekvenser av immunmedierade biverkningar.

För biverkningar som misstänks vara immunmedierade utför lämplig utvärdering för att bekräfta etiologin eller utesluta andra orsaker. Baserat på biverkningens allvarlighetsgrad, senarelägg behandling med KEYTRUDA och sätt in kortikosteroider. Särskilda riktlinjer för hantering av immunmedierade biverkningar finns i produktresumén för KEYTRUDA.

Samråd med en onkolog eller annan medicinsk specialist kan vara till hjälp för hantering av organspecifika immunmedierade biverkningar.

Läs även produktresumén för KEYTRUDA som finns på www.fass.se samt www.ema.europa.eu, eller ring Medicinsk Information på +46 77 570 04 88 för ytterligare information.

Senast granskad av Läkemedelsverket 2019-11-28

Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

SPI-6233 aug 2023

MSD, Box 45192, S-104 30 Stockholm, msd.se, 08-578 135 00



MSD