

Dailiport® (takrolimus) depotkapsel

Denna information lämnas ut av vårdgivare till dig som ordinerats behandling med Dailiport depotkapsel. Dailiport är ett receptbelagt läkemedel, används för att hindra kroppen från att avstöta det transplanterade organet.

För fullständig information, läs bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen noggrant. Vid frågor, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Introduktion

Du har fått läkemedlet Dailiport förskrivet av din läkare. Det tillhör gruppen immundämpande läkemedel, som minskar kroppens reaktion på främmande vävnad, som till exempel ett transplanterat organ. Den aktiva substansen i Dailiport är takrolimus.

Hur du använder Dailiport

Ta alltid Dailiport enligt läkares ordination. Eftersom det finns flera olika mediciner som innehåller samma verksamma substans, takrolimus, bör du kontrollera att namnet på förpackningen är detsamma som din läkare har ordinerat. Apoteket får inte byta ut denna medicin mot annan som innehåller takrolimus. Dailiport tas en gång dagligen på morgonen.

För bästa behandlingsresultat är det viktigt att du varje dag tar den angivna dosen vid den tidpunkt som bestämts. Medicinen tas bäst upp i kroppen på fastande mage, men om du kommit överens med din läkare att ta dosen tillsammans med måltid går detta också bra. Det viktiga är att alltid göra likadant. Svälj kapseln tillsammans med vatten. Undvik grapefrukt och grapefruktjuice när du tar Dailiport eftersom upptaget av läkemedlet kan påverkas kraftigt och effekten bli otillräcklig.

Dosering

Doseringen av Dailiport är individuell och kan av din läkare komma att justeras såväl uppåt som nedåt beroende på ett flertal faktorer. Regelbundna blodprov tas för att kontrollera hur mycket läkemedel som tagits upp i kroppen.

Dailiport finns i fem olika styrkor, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg och 5 mg. Din läkare kommer att tala om för dig hur många kapslar som du ska ta av respektive styrka för att du ska få rätt dos.

Om du har glömt att ta Dailiport

Om du råkar glömma att ta din dos på morgonen skall du samma dag ta den så snart du kommer ihåg det. Ta inte dubbel eller annan högre dos för att kompensera för en glömd dos.

Om du tagit för stor dos av Dailiport

Om du tagit för stor dos, eller om någon annan råkat ta av din medicin, bör läkare, sjukhus, sjukvårdsrådgivning eller Giftinformationscentralen (tel. 112) genast kontaktas.

Att tänka på vid behandling med Dailiport

Läs noga igenom bipacksedeln som finns med i läkemedelsförpackningen.

Informera din läkare om du tar andra läkemedel, även receptfria. Undvik naturläkemedel/naturpreparat eftersom dessa kan påverka upptaget av Dailiport.

Om du skulle drabbas av kräkningar och/eller diarré mer än vid något enstaka tillfälle bör läkare kontaktas eftersom det kan bli aktuellt med ändring av dosen.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Dailiport ge biverkningar. Vid nyttillkomna symptom bör läkare kontaktas. Är besvären uttalade bör sjukhus genast uppsökas. Detta gäller särskilt vid misstanke om överkänslighetsreaktion (utslag, svullnad i ansikte, andningssvårigheter) eller infektion (feber, frossa).

Var försiktig i solen

När du äter immundämpande läkemedel blir din hud mer känslig för solens

strålning och blir lättare bränd och skadad. Bär lämpliga skyddande kläder och använd solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor.

Graviditet och amning

Tala om för din läkare om du är gravid, ammar, blir gravid eller planerar att bli gravid inom den närmaste framtiden. Behandling med Dailiport kan övervägas till gravida kvinnor efter individuell bedömning. Du skall dock inte amma under tiden du tar Dailiport.

Så här förvarar du Dailiport

Förvaras utom syn- och räckhåll från barn. Läkemedlet skall användas före utgångsdatum som anges på kartongen efter "Utg.dat." och på tryckförpackningen efter "EXP". Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad. Förvaras i originalförpackningen (aluminiumpåse). Använd alla kapslar inom 12 månader efter att påsen har öppnats. Läkemedlet är ljus- och fukt känsligt. Får inte kastas i avlopp eller i hushållsavfall. Ta med medicin som ej skall användas till apotek eller sjukvårdsinrättning som tar hand om den på ett miljörätt sätt.



0,5 mg




1 mg



2 mg



3 mg



5 mg

Texten är framtagen av Docent Bengt Gustafsson, Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i samarbete med Sandoz.

Förkortad bipacksedelinformation. OBS! Läs noggrant hela bipacksedeln som medföljer förpackningen.

Dailiport (takrolimus) ATC-kod L04AD02, immunsuppressivt medel. (Rx;F – läkemedlet är receptbelagt/samtliga förpackningar är subventionerade). Styrkor 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg och 5 mg hård kapsel. Förpackning om 50 st i blister. **Användning:** Förebyggande av avstötning efter lever- eller njurtransplantation. Dailiport innehåller den aktiva substansen takrolimus som är ett immundämpande läkemedel som påverkar immunförsvaret i din kropp så att det skall acceptera det transplanterade organet. Dailiport kan även användas tillsammans med andra läkemedel för behandling av en konstaterad avstötningsreaktion efter lever-, njur- eller andra organtransplantationer. Dailiport kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Kontakta läkare eller apotek om du har några frågor om läkemedlet. **Ta inte Dailiport** om du är allergisk mot takrolimus eller något tillsatssämne, sirolimus, något makrolidantibiotikum (t.ex. erytromycin, klaritromycin, josamycin), jordnötter eller soja. Dailiport och läkemedel som innehåller takrolimus med omedelbar frisättning innehåller alla den aktiva substansen takrolimus. Dailiport tas alltid en gång dagligen, medan takrolimuskapslar tas två gånger dagligen. Dailiport och takrolimuskapslar med omedelbar frisättning är inte utbytbara. Bipacksedeln ändrades senast 2021-06-01.

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Köpenhamn S, Danmark, www.sandoz.se