

Viktiga kontaktuppgifter

Läkarens namn

Telefonnummer

Telefonnummer kvällstid

Mitt namn

Mitt telefonnummer

Kontaktperson i nödsituationer

Kontaktpersonens telefonnummer

NP-SE-DST-PINF-250003, Mars 2025

Patientkort

JEMPERLI (dostarlimab)

Viktig säkerhetsinformation för att minska risken för immunmedierade biverkningar

JEMPERLI kan orsaka biverkningar som ibland kan bli allvarliga eller livshotande och leda till döden. Dessa biverkningarna kan uppkomma när som helst under eller efter behandlingen. Biverkningar kan uppkomma på flera ställen i kroppen samtidigt.

Kontakta omedelbart din läkare om du får något av de symtom som listas i detta kort, om dina symtom förvärras, eller om du upplever symtom som inte listas i detta kort. **Omedelbar läkarvård kan förhindra att situationen blir allvarligare.** Din läkare kan ordinera andra läkemedel för behandling av dina symtom, flytta fram följande dos av JEMPERLI eller avsluta behandlingen.

För mer information, se bipacksedeln på adressen www.fass.se eller kontakta GlaxoSmithKline AB på telefon 08-638 93 00.

VIKTIG INFORMATION

- Försök inte diagnostisera eller behandla biverkningar själv
- **Ha alltid med dig detta kort**, även när du reser eller besöker jourmottagningen eller en annan läkare
- Ha kvar detta kort i minst 4 månader efter den sista dosen av JEMPERLI
- Se till att tala om för hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar dig att du får behandling med JEMPERLI, och visa dem detta kort

Kontakta ditt onkologiska vårdteam om du får något av följande tecken eller symtom, andra tecken eller symtom eller om symtomen förvärras.

Lungor

- Andfåddhet
- Bröstsmärta
- Hosta

Tarmkanal

- Diarré (lös, tätare tarmtömning)
- Svart, tjäraktig, klibbig avföring
- Blod eller slem i avföringen
- Svår magsmärta eller ömhet

Lever

- Illamående och/eller kräkningar
- Minskad/ingen aptit (inga hungerkänslor)
- Smärta på höger sida av buken (magen)
- Gulfärgning av hud eller ögonvitor
- Mörk urin (te-färgad)
- Större benägenhet att få blödningar eller blåmärken än normalt

Hormonkörtlar

- Hjärtklappning
- Viktminskning eller viktökning
- Synförändringar
- Ökad svettning
- Håravfall
- Frusenhet
- Extrem trötthet
- Starkare hunger- eller törstkänslor än normalt
- Behov att kissa oftare
- Förstoppning (hård, färre tarmtömningar)
- Djupare röst
- Yrsel eller svimning
- Huvudvärk som inte försvinner

eller ovanlig huvudvärk

Njurar

- Minskad mängd urin
- Svullna fotleder
- Rött (blodigt) urin

Hud

- Hudutslag, klåda, fjällande hud eller hudsår
- Sår i munnen, näsan, halsen eller kring könsorganen

Övriga

- Svår eller ihållande muskelvärk eller muskelsvaghet
- Förvirring och problem med minnet
- Anfall
- Förändrat humör eller beteende
- Stickningar eller svaghet i armar eller ben
- Feber eller influensaliknande symtom
- Onormala hjärtslag

JEMPERLI kan även orsaka andra biverkningar. Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Biverkningar kan också rapporteras till GlaxoSmithKline AB på telefon 08-638 93 00. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Viktig information till hälso- och sjukvårdspersonal

Denna patient får behandling med JEMPERLI, som kan orsaka immunmedierade biverkningar. Dessa kan uppkomma när som helst under eller efter behandlingen. Immunmedierade biverkningar kan förekomma i vilket organ eller vilken vävnad som helst och kan påverka flera system i kroppen samtidigt. Bedöm patienten med avseende på tecken och symtom på immunmedierade biverkningar (antingen sådana som listas i detta kort eller andra biverkningar). Tidig diagnos och lämplig behandling är nödvändiga för att minimera eventuella konsekvenser av immunmedierade biverkningar.

Adekvat bedömning av misstänkta immunmedierade biverkningar ska göras för att bekräfta etiologin och utesluta andra orsaker. Baserat på biverkningens allvarlighetsgrad ska behandlingen med JEMPERLI tillfälligt sättas ut eller sättas ut permanent och kortikosteroider eller annan lämplig behandling sättas in.

Detaljerade anvisningar om behandling av immunmedierade biverkningar finns i produktresumén för JEMPERLI.

Konsultation av en onkolog eller annan specialistläkare kan vara till hjälp vid behandling av immunmedierade biverkningar.

För mer information, se produktresumén för JEMPERLI på adressen www.fass.se eller ring GlaxoSmithKline AB på telefon 08-638 93 00.