

Viktig säkerhetsinformation för patienter som får Lunsumio (*mosunetuzumab*) ▼



PATIENTKORT

- Ha alltid med dig detta kort under din behandling med Lunsumio.
- Visa detta kort för alla läkare som är delaktiga i din vård.

Kontaktinformation

Patientens namn:

Förskrivande läkares namn:

Förskrivande läkares telefonnummer:

Datum då behandling med Lunsumio initierades:

Se Lunsumios bipacksedel, som finns tillgänglig på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se under Sök läkemedelsfakta, för ytterligare information om behandling med Lunsumio. Denna är tänkt att användas tillsammans med detta patientkort.

▼ *Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4 i bipacksedeln.*

Information till patienten/vårdgivaren

Lunsumio kan orsaka biverkningar som cytokinfrisättningssyndrom (CRS) och neurologisk toxicitet, inklusive immuneffektorcell-associerat neurotoxicitetssyndrom (ICANS).

Kontakta **omedelbart** din läkare eller sök akut hjälp om du har **något** av dessa symptom:

Cytokinfrisättningssyndrom (CRS); symptom att vara uppmärksam på:

- feber (38 °C eller högre)
- snabba eller oregelbundna hjärtslag
- frossa eller skakningar
- förvirring
- svår trötthet eller svaghet
- svårt att andas
- yrsel eller svimningskänslor
- svimning
- dimsyn
- kall eller blek och fuktig hud
- huvudvärk

Immuneffektorcell-associerat neurotoxicitetssyndrom (ICANS); symptom att vara uppmärksam på:

- förvirring eller desorientering
- hallucinationer (ser, hör eller känner saker som inte finns där)
- krampanfall
- minnessvårigheter
- språksvårigheter (svårt att tala eller talförändringar)
- problem med omdömet (svårt att tänka)
- koncentrationssvårigheter (svårt att hålla sig vaken)

Information till den behandlande läkaren

Denna patient får behandling med Lunsumio **vilket kan orsaka cytokinfrisättningssyndrom (CRS) och immuneffektorcell-associerat neurotoxicitetssyndrom (ICANS).**

- Utvärdera patienten omedelbart och behandla symtomen.
- Vid misstanke om CRS, se avsnitt 4.2 i produktresumén för instruktioner om hantering av CRS.
- Vid misstanke om ICANS, se avsnitt 4.2 i produktresumén för instruktioner om hantering av ICANS.
- **Kontakta förskrivande läkare** om möjligt eftersom nästa infusion av Lunsumio kan behöva modifieras.