
Odomzo® (sonidegib) kapslar påminnelsekort för vårdgivare

Odomzo® kan orsaka fosterdöd eller svåra fosterskador när det ges till en gravid kvinna. Hedgehog-signalvägshämmare har visats vara embryotoxiska och/eller teratogena hos djur. Odomzo® får inte användas under graviditet.

Se den lokala produktinformationen som är relevant för ditt land eller kontakta ditt info.se@sunpharma.com.

Odomzo® är kontraindicerat för kvinnor som är gravida eller ammar.

Se medföljande lokal produktinformation för omfattande säkerhetsinformation.

Påminn patienter som tar Odomzo® (sonidegib) kapslar om följande:

- Bli inte gravid.
- Amma inte.
- Donera inte sperma.
- Ha inte oskyddat samlag, även om du är en kvinna som har genomgått sterilisering ELLER är en man som har genomgått vasktomi.
- Kvinnor i fertil ålder bör alltid använda graviditetsförebyggande åtgärder, såsom att avstå från samlag ELLER använda två rekommenderade preventivmedelsmetoder.
- Kvinnliga patienter måste ta ett graviditetstest inom 7 dagar innan Odomzo®-behandlingen påbörjas och en gång i månaden under behandlingen.

**KOM IHÅG ATT GRANSKA OCH FYLLA I FORMULÄRET FÖR
VERIFIERING AV INFORMATION SOM FINNS I ODOMZO®
PATIENTBROSCHYREN**

Kom också ihåg att berätta för dina patienter att:

- Förvara medicin utom syn- och räckhåll för barn.
- Ge aldrig kapslar till någon som inte är en vårdgivare.
- Kassera oanvända kapslar i slutet av behandlingen i enlighet med lokala krav (om tillämpligt, t.ex. genom att lämna tillbaka kapslarna till apoteket eller läkaren).
- Avstå från att donera blod under behandlingen och i 20 månader efter den sista dosen.

2 TYPER AV PREVENTIVMEDEL MÅSTE ANVÄNDAS, 1 UR VARJE KOLUMN

BARRIÄRMETODER

- Manlig kondom
(med spermiedödande medel,
om tillgängligt) **ELLER**
- Pessar med spermiedödande medel



MYCKET EFFEKTIVA TYPER AV PREVENTIVMEDEL

- Intrauterin enhet (IUD) **ELLER**
- Äggledarsterilisering **ELLER**
- Vasektomi