



Var du kan hitta mer information om ditt läkemedel

Liksom alla läkemedel kan Ozurdex® orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. En utförlig lista över biverkningar finns i den bipacksedel som medföljer Ozurdex®.

Läs bipacksedeln för mer information om ditt läkemedel. Be läkaren eller sjuksköterskan ge dig bipacksedeln eller gå in på **www.fass.se**

Om du önskar ytterligare kopior av denna Patientguide vänligen kontakta **info@abbvie.se**

Denna Patientguide finns även i digitalt format på **www.fass.se**

En ljudversion av denna Patientguide finns även tillgänglig via QR-koden nedan och på **www.fass.se**



Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan dessutom rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, **www.lakemedelsverket.se**

Ozurdex® Patientguide

(dexametason) 700 mikrogram intravitreal implantat

Denna patientguide innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska vara medveten om före och efter behandling med Ozurdex®.

Varför ska jag läsa denna Patientguide?	2
Behandling	2
Hur ska jag förbereda mig inför min behandling?	2
Vad ingår i min behandling?	3
Vad händer efter behandlingen?	3
Var hittar jag mer information?	4

Varför ska jag läsa denna Patientguide?

Behandling med Ozurdex® kan vara förknippat med följande risker:

- Ökat tryck i ögat, vilket kan leda till glaukom (en ögonsjukdom som orsakar synnedsättning).
- Inflammation inuti ögat (vanligtvis orsakat av infektion).

För att förhindra sjukdomsutveckling och minimera allvarliga konsekvenser är det viktigt för dig att vara medveten om tidiga tecken och symtom på dessa risker förknippade med Ozurdex®.

Kontakta din läkare eller sjuksköterska omedelbart om du upplever något av dessa tecken eller symtom efter behandling med Ozurdex®.

- Försämrad syn efter injektionen.
- Smärta eller obehaglig känsla i eller runt ögat.
- Ökat antal grumlingar eller fläckar i synfältet.
- Dimsyn som varar mer än ett dygn efter injektionen.
- Ögonrodnad som förvärras kontinuerligt.
- Utsöndring från ögat.

Hur ska jag förbereda mig inför min behandling?

Innan du får Ozurdex kan din läkare ge dig ögondroppar med antibiotika. Du ska i så fall använda dessa i 3 dagar före din behandling och du ska fortsätta att använda ögondropparna i 3 dagar efter din behandling. Observera att användning av ögondroppar med antibiotika kan variera enligt lokala riktlinjer.

Vad ingår i min behandling?

För att förbereda dig inför din behandling kommer läkaren att:

- Tvätta ditt öga för att undvika infektion och eventuellt ge dig ytterligare ögondroppar med antibiotika.
- Täcka över ditt ansikte med en särskild duk.
- Ge bedövning i ögat så att du inte känner någon smärta.
- Använda en anordning som försiktigt håller ögat öppet.

Läkaren kommer sedan att använda en särskild applikator för att injicera läkemedlet genom den vita delen av ditt öga.

Du kan höra ett klickande ljud under injektionen och känna ett visst tryck på ögat.

Vad händer efter behandlingen?

Efter injektionen:

- Kan du se otydligt (dimsyn) upp till en dag efteråt.
- Kan du också se grumlingar eller fläckar, detta är vanligt men bör försvinna med tiden.
- Kontakta din läkare om dessa symtom inte försvinner eller blir värre.
- Om du normalt sett kör bil eller använder maskiner ska du inte fortsätta med det förrän all dimsyn har gått tillbaka.
- Efter behandlingen genomförs rutinmässiga undersökningar. Du kommer att bli kallad till ett återbesök för att undersöka ögontrycket.