

Sandoz A/S

Påminnelsekort till patient rörande osteonekros i käken.

Detta påminnelsekort innehåller viktig
säkerhetsinformation som du behöver känna
till före och under behandling med
Aclasta (zoledronsyra).

S A N D O Z

Din läkare har rekommenderat att du får Aclasta (zoledronsyra) som används för att behandla osteoporos hos kvinnor efter klimakteriet, osteoporos hos vuxna män och osteoporos orsakat av behandling med kortikosteroider samt Pagets sjukdom hos vuxna. Osteoporos medför förtunning och försvagning av benvävnaden och ökar risken för benbrott.

Mycket sällsynta fall av en biverkning som kallas osteonekros i käken (ONJ) (benskador i käken) har rapporterats hos patienter som behandlats med zoledronsyra mot osteoporos. ONJ kan uppträda även efter att behandlingen har avslutats.

Det är viktigt att försöka förhindra osteonekros i käken att utvecklas, eftersom det är ett smärtsamt tillstånd som kan vara svårt att behandla.

För att minska risken för att utveckla osteonekros i käken finns det vissa försiktighetsåtgärder du bör vidta:

Innan du börjar behandlingen:

Tala med din läkare/sjuksköterska (hälso- och sjukvårdspersonal) om du har några problem med din mun eller tänder. Din läkare kan be dig genomgå en tandläkarundersökning om du:

- tidigare har behandlats med ett annat läkemedel som är en bisfosfonat
- använder läkemedel som kallas kortikosteroider (som prednisolon eller dexametason)
- är rökare
- har cancer
- inte genomgått någon tandundersökning på länge har problem med munnen eller tänderna

Under behandlingen:

- Du bör upprätthålla en god munhygien, borsta tänderna regelbundet och gå på regelbundna tandkontroller. Om du bär tandproteser bör du se till att dessa passar ordentligt.
- Om du får tandbehandling eller ska genomgå tandkirurgi (t.ex. dra ut en tand), informera din läkare om din tandvård och berätta för din tandläkare att du behandlas med zoledronsyra.
- Kontakta din läkare och tandläkare omedelbart om du upplever något problem med din mun eller tänder såsom lösa tänder, smärta eller svullnad, eller sår som inte läker eller vätskar, eftersom detta kan vara tecken på osteonekros i käken.

Läs bipacksedeln som följer med läkemedlet för mer information.

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14,
2300 Köpenhamn S, Danmark
mi.sweden@sandoz.com
www.sandoz.se