

TOUJEO® (INSULIN GLARGIN 300 E/ML)

Toujeo® 300 E/ml SoloStar®, injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna


Toujeo® 300 E/ml DoubleStar™, injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Guide för patienter och/eller vårdgivare

- Om du har fått Toujeo® förskrivet ska du få utbildning i hur du ska använda Toujeo®-pennan av sjukvårdspersonal. Du måste även läsa igenom bipacksedeln som medföljer pennan.
- Detta dokument är endast en guide.
- Starta med den dos som du har blivit förskriven.

• Viktig information om justeringar de första veckorna vid förskrivning av Toujeo®

- Insulin glargin 300 enheter/ml (Toujeo®) och insulin glargin 100 enheter/ml (Lantus®) **är inte bioekvivalenta och är därför ej utbytbara mot varandra utan dosjustering** (detta betyder att dessa läkemedel inte är identiska och du kan inte byta mellan dem utan att justera dosen).
- Byte från den ena insulinbehandlingen till den andra bör bara göras när den blivit förskriven av sjukvårdspersonal. Den dos du blivit rekommenderad av sjukvårdspersonal ska alltid följas.
- Ditt blodsocker behöver följas noga under bytet och de efterföljande veckorna.
- Toujeo® (insulin glargin 300 E/ml) finns tillgängligt i två olika pennor:



Dosinställningen med Toujeo® SoloStar® är 1 E åt gången och med Toujeo® DoubleStar™ är 2 E åt gången.

Den dos som levereras är den som visas i doseringsfönstret.

Vänligen kontakta behandlande läkare/diabetessjuksköterska för mer information.

Läs igenom instruktionerna i bipacksedeln före administrering av Toujeo®.

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller med apoteket. Det gäller även biverkningar som inte står i bipacksedeln.

Rapportera biverkningar till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala; www.lakemedelsverket.se eller till Sanofi via www.sanofi.se.