

VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Min läkares namn:

Läkarens/sjukhusets telefonnummer:

Annan sjukhuskontakt:

Ytterligare telefonnummer:

Utanför kontorstid:

PATIENTUPPGIFTER

Namn:

Telefonnummer:

Omsorgsperson/Nödkontakt, namn och telefonnummer:

Viktig information för patienter och omsorgspersoner

- IMJUDO® kan orsaka biverkningar som kräver omedelbar medicinsk behandling för att förhindra att de förvärras
- Kontakta sjukvård om du är osäker över något symtom
- Biverkningar kan förekomma veckor och månader efter avslutad behandling
- Läs bipacksedeln noggrant för ytterligare information innan du påbörjar behandlingen
- Patienter ska visa detta kort till de läkare de konsulterar

Viktig information för hälso- och sjukvårdspersonal

- Denna patient behandlas med IMJUDO® som kan orsaka immunmedierade biverkningar
- Tidig diagnos och lämplig hantering är viktigt för minimering av potentiellt livshotande komplikationer
- Konsultation med onkolog eller patientens vårdteam kan vara nödvändigt vid hantering av immunmedierade biverkningar

IMJUDO® (tremelimumab)
Patientkort

Denna broschyr är endast riktad till patienter som förskrivits IMJUDO® och deras omsorgspersoner. Patienter ska alltid ha detta kort med sig.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Vad du ska göra ifall du misstänker en biverkning, även om den inte nämns i detta kort eller i bipacksedeln

- Kontakta omedelbart ditt vårdteam eller uppsök medicinsk vård om du upplever biverkningar
- Behandla INTE dina symtom på egen hand innan du konsulterat sjukvård
- Tveka INTE att kontakta sjukvård

Milda symtom kan snabbt förvärras om de inte behandlas.

Möjliga symtom

ÖGON

- Dimsyn
- Dubbelsyn
- Gula ögonvitor

BRÖSTKORG

- Bröstsmärta
- Oregelbundna eller snabba hjärtslag
- Andningssvårigheter
- Ny eller förvärrad hosta

MAGSÄCK OCH TARMAR

- Ihållande buksmärta
- Kraftigt illamående eller kräkning
- Diarré
- Svår förstoppning

MUSKLER OCH LEDER

- Ihållande eller svår muskelsmärta, svaghet eller förlamning
- Stelhet i axlar, nacke eller höft
- Stickningar eller domningar i armar och ben

HUD

- Gul hud
- Hudutslag och/eller klåda
- Ökade svettningar

ALLMÄNNA SYMTOM

- Feber
- Svår huvudvärk
- Förvirring
- Yrsel
- Extrem trötthet
- Oförklarlig viktninskning
- Svullnad i fotleder
- Blod i urin