

Rivastigmin STADA Arzneimittel depotplåster Instruktioner för användning och dagbok över medicinering


Denna information är viktig för att säkerställa en trygg användning av Rivastigmin depotplåster.

Instruktioner för användning






- Instruktioner för användning och dagbok över medicinering är viktiga för att säkerställa en trygg användning av Rivastigmin depotplåster.
- Om du har frågor eller behöver mer information om hur detta läkemedel ska användas, läs bipacksedeln som finns i kartongen.
- Använd alltid Rivastigmin STADA Arzneimittel depotplåster enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Var ska ditt Rivastigmin STADA Arzneimittel depotplåster fästas?

- Innan du fäster plåstret, se till att huden är ren, torr och hårfri, fri från puder, olja, fuktighetskräm eller lotion, som kan göra att plåstret inte fäster ordentligt på huden, fri från rispor, utslag och/eller irritation.
- **Om du redan använder plåster, tar du bort det du har på dig innan du sätter på ett nytt.** Om du har flera plåster samtidigt fästade på kroppen kan du få en alltför hög dos av läkemedlet, vilket potentiellt kan vara farligt.
- När du byter plåster måste du fästa det nya plåstret på ett **nytt ställe** på huden varje gång (t.ex. på höger sida av kroppen en dag, på vänster sida nästa dag, på övre delen av kroppen en dag, på undre delen av kroppen nästa dag). Sätt inte ett nytt plåster på samma hudyta två gånger inom 14 dagar. Fäst **ETT** plåster per dag på **ENDAST ETT** av de möjliga ställena som visas i följande diagram:



Hur du använder Rivastigmin depotplåster

	Om du redan använder plåster, tar du försiktigt bort det du har på dig innan du sätter på ett nytt. Patienter som påbörjar behandling för första gången eller som börjar om med rivastigmin efter avbrott i behandlingen, vänligen börja vid nästa bild.
	Varje plåster är individuellt förpackat i ett förseglat plåsterkuvert. Öppna plåsterkuvertet endast när du är redo att sätta på plåstret. Klipp upp plåsterkuvertet längs den förseglade kanten. Riv kuverten för att öppna. För att undvika att plåstret skadas, klipp inte hela kuverten. Ta ur plåstret från plåsterkuverten.
	Ta bort omslaget från plåstrets övre, hudfärgade sida och kasta det. En skyddande film täcker den självhäftande sidan av plåstret. Dra av ena sidan av skyddsfilmerna och ta inte på den självhäftande delen av plåstret med fingrarna.
	Fäst den självhäftande sidan av plåstret på övre eller undre delen av ryggen, överarmen eller bröstkorgen, och dra sedan av den andra delen av skyddsfilmerna.
	Pressa sedan fast plåstret ordentligt på plats i åtminstone 30 sekunder med handflatan och se till att kanterna fäster ordentligt.

Viktigt att komma ihåg

- Ta av föregående dags plåster innan ett nytt plåster sätts på.
- Använd endast ETT plåster per dag.
- Klipp inte plåstret i bitar.
- Plåstret ska tryckas fast ordentligt med handflatan i åtminstone 30 sekunder.

Hur du använder nedanstående tabell

- Tabellen nedan kan användas som dagbok över din medicinering för att hålla reda på när du satt på och tagit av ett plåster och rotation av placering.
- Bocka av i tabellen när du tagit av föregående dags depotplåster.
- Fyll i datum och veckodag när du fäst ett nytt depotplåster.
- Notera vilket ställe på kroppen där du fäst det nya depotplåstret.
- Om du har frågor eller behöver mer information om användningen, läs bipacksedeln eller kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Gammalt plåster har tagits bort?	Datum när nytt plåster sätts på	Veckodag när nytt plåster sätts på	Ställe för nytt plåster
<i>ja</i>	<i>13 april 2023</i>	<i>torsdag</i>	<i>mitt på vänstra överarm</i>