

Över

Tejp

Under

Paracetamol Baxter

10 mg/ml

INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

För barn som väger ≤ 10 kg:

- Dosen för dessa patienter är 7,5 mg/kg (dvs 0,75 ml/kg).** Den maximala dagliga dosen för dessa patienter ska inte överskrida 300 mg (30 mg/kg) under 24 timmar.
- Intervallet mellan varje administrering måste vara minst 4 timmar. Högst 4 doser får ges under 24 timmar.
- Den volym av Paracetamol Baxter 10 mg/ml som administreras ska aldrig överskrida 7,5 ml per dos för denna viktgrupp. Mindre volymer krävs vid lägre vikt.**
- Paracetamol Baxter injektionsflaskan ska inte hänges upp som en infusion på grund av den lilla volym läkemedel som ska administreras till denna population.
- En 5 ml eller 10 ml spruta ska användas för att mäta upp den dos som är lämplig för barnets vikt och önskad volym.
- Den volym som ska administreras ska dras upp ur injektionsflaskan och sen administreras utspädd eller utspädd [från en till nio volymer spädningsvätska] i 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning och administreras under 15 minuter.

För barn, ungdomar och vuxna som väger > 33 kg men ≤ 50 kg:

- Dosen för dessa patienter är 15 mg/kg (dvs 1,5 ml/kg).** Den maximala dagliga dosen för dessa patienter ska inte överskrida 3 g (60 mg/kg) under 24 timmar.
- Intervallet mellan varje administrering måste vara minst 4 timmar. Högst 4 doser får ges under 24 timmar.
- Den volym av Paracetamol Baxter 10 mg/ml som administreras ska aldrig överskrida 75 ml per dos.**

Detta verktyg ingår i riskhanteringsplanen för Paracetamol Baxter för att minimera risken för överdos.

Datum för senaste översyn av texten: 12/2022

Baxter Holding B.V.
Kobaltweg 49, 3542CE Utrecht
Nederländerna

Admistreringsprotokoll. Doseringsstabell för Paracetamol Baxter 10 mg/ml (1)

Patientens vikt	Dos per administrering	Volym per administrering	Maximal volym per administrering baserat på grupps överviktsgräns (ml)*	Maximal daglig dos
≤ 10 kg	7,5 mg/kg	0,75 ml/kg	7,5 ml	30 mg/kg
> 10 kg till ≤ 33 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	48,5 ml	60 mg/kg, utan att överskrida 2 g
> 33 kg till ≤ 50 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	75 ml	60 mg/kg, utan att överskrida 3 g
> 50 kg med ytterligare risk-faktorer för levertoxicitet	1 g	100 ml	100 ml	3 g
> 50 kg utan ytterligare risk-faktorer för levertoxicitet	1 g	100 ml	100 ml	4 g

* Patienter som väger mindre kräver mindre volymer.

(1) Produktresumé för Paracetamol Baxter 10 mg/ml infusionsvätska, lösning.

Det kortaste intervall mellan varje administrering för patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion måste vara minst 6 timmar. Högst 4 doser får ges under 24 timmar.

Korttidsbehandling av måttlig smärta, särskilt efter kirurgi, och för korttidsbehandling av feber när intravenös administrering är kliniskt motiverad för att snabbt behandla smärta eller feber och/eller när andra administreringsvägar inte är möjliga. (1)

eller feber och/eller när andra administreringsvägar inte är möjliga. (1)

Doseringsverktyg

Doseringsverktyg

Paracetamol Baxter

10 mg/ml

INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

Dra

Det kortaste intervallet mellan varje administrering måste vara minst 4 timmar. Högst 4 doser får ges under 24 timmar.

Det kortaste intervallet mellan varje administrering för patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion måste vara minst 6 timmar.

kg – Patientens vikt	ml – Volym av paracetamol	mg – Mängd av paracetamol
1	0,75	7,5
2	1,5	15
3	2,25	22,5
4	3	30
5	3,75	37,5
6	4,5	45
7	5,25	52,5
8	6	60
9	6,75	67,5
10	7,5	75
11	8,25	82,5
12	9	90
13	9,75	97,5
14	10,5	105
15	11,25	112,5
16	12	120
17	12,75	127,5
18	13,5	135
19	14,25	142,5
20	15	150
21	15,75	157,5
22	16,5	165
23	17,25	172,5
24	18	180
25	18,75	187,5
26	19,5	195
27	20,25	202,5
28	21	210
29	21,75	217,5
30	22,5	225
31	23,25	232,5
32	24	240
33	24,75	247,5
34	25,5	255
35	26,25	262,5
36	27	270
37	27,75	277,5
38	28,5	285
39	29,25	292,5
40	30	300
41	30,75	307,5
42	31,5	315
43	32,25	322,5
44	33	330
45	33,75	337,5
46	34,5	345
47	35,25	352,5
48	36	360
49	36,75	367,5
50	37,5	375
51	38,25	382,5
52	39	390
53	39,75	397,5
54	40,5	405
55	41,25	412,5
56	42	420
57	42,75	427,5
58	43,5	435
59	44,25	442,5
60	45	450
61	45,75	457,5
62	46,5	465
63	47,25	472,5
64	48	480
65	48,75	487,5
66	49,5	495
67	50,25	502,5
68	51	510
69	51,75	517,5
70	52,5	525
71	53,25	532,5
72	54	540
73	54,75	547,5
74	55,5	555
75	56,25	562,5
76	57	570
77	57,75	577,5
78	58,5	585
79	59,25	592,5
80	60	600
81	60,75	607,5
82	61,5	615
83	62,25	622,5
84	63	630
85	63,75	637,5
86	64,5	645
87	65,25	652,5
88	66	660
89	66,75	667,5
90	67,5	675
91	68,25	682,5
92	69	690
93	69,75	697,5
94	70,5	705
95	71,25	712,5
96	72	720
97	72,75	727,5
98	73,5	735
99	74,25	742,5
100	75	750

Korttidsbehandling av måttlig smärta, särskilt efter kirurgi, och för korttidsbehandling av feber när intravenös administrering är kliniskt motiverad för att snabbt behandla smärta eller feber och/eller när andra administreringsvägar inte är möjliga. (1)

(1) Produktresumé för Paracetamol Baxter 10 mg/ml infusionsvätska, lösning.

Baxter Holding B.V.
Kobaltweg 49, 3542CE Utrecht
Nederländerna

DOSTL10SE