# Patientkort

## ASPAVELI® (pegcetakoplan)

**HA ALLTID DET HÄR KORTET MED DIG**
**VISA DET FÖR ALL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL SOM VÅRDAR DIG OCH OM DU BEHÖVER SJUKHUSVÅRD**

**Meddelande om sekretess och dataskydd**
All information som du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Sobis dataskyddspolicy och i enlighet med de syften för vilka den lämnas. Du hittar fullständig information om hur personuppgifter skyddas hos Sobi i vår policy som finns här: *https://sobi.se/integritetspolicy*. Om du inte samtycker till denna användning av dina uppgifter, ber vi dig att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna på webbsidan.

## INFORMATION TILL BEHANDLANDE LÄKARE

Denna patient har ordinerats ASPAVELI® (pegcetakoplan), som kan öka patientens risk för allvarliga infektioner orsakade av bakterier som *Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis* och *Haemophilus influenzae* typ B.

- Allvarliga bakteriella infektioner kan snabbt bli livshotande om de inte upptäcks och behandlas i tid.
- Kontrollera patienten noga för tidiga tecken och symtom på allvarlig infektion och utvärdera omedelbart vid misstanke om en infektion. Behandla konstaterade infektioner utan dröjsmål.
- Kontakta patientens behandlande läkare snarast möjligt vid misstanke om en allvarlig infektion.

Mer information om ASPAVELI® finns i den fullständiga produktresumén.

Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via www.lakemedelsverket.se.

Patienter som får ASPAVELI® ska alltid ha med sig detta kort.

Sobi och ASPAVELI® är varumärken som tillhör Swedish Orphan Biovitrum AB (publ).
© 2025 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) – Med ensamrätt. www.sobi.com
NP-50068 | v.2 Juli 2026

ASPAVELI® kan öka risken för allvarliga och livshotande infektioner. Allvarliga infektioner kan snabbt bli livshotande om de inte upptäcks och behandlas i tid. Kontakta omedelbart läkare eller sök akutvård om du får något av följande tecken och symtom på en allvarlig infektion:

- huvudvärk och feber
- feber och utslag
- feber med eller utan skakningar och frossa
- andfåddhet
- hög hjärtfrekvens
- kallsvettig hud
- huvudvärk med stel nacke eller stel rygg

- huvudvärk med illamående eller kräkningar
- ljuskänsliga ögon
- muskelvärk med influensaliknande symtom
- förvirring
- extrem smärta eller extremt obehag.

**Ha alltid detta kort med dig** under behandlingen och i 2 månader efter den sista dosen. Risken för allvarliga infektioner kan kvarstå i flera veckor efter den sista dosen.

**Visa detta kort för all hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar dig.**

Patientens namn

Namn, behandlande läkare

Telefonnummer, behandlande läkare