CAMZYOS® (mavakamten)

Patientguide

För mer information, se CAMZYOS bipacksedel:
www.fass.se eller www.ema.europa.eu

Du hittar aktuellt utbildningsmaterial på www.fass.se

För mer information, kontakta Bristol Myers Squibb Medicinsk Information:
+46 8 58507304 eller medinfo.sweden@bms.com

Version: 3500-SE-2600014/November 2026

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Om du får biverkningar, tala med läkare. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket: www.lakemedelsverket.se

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION FÖR KVINNOR I FERTIL ÅLDER

Om du är i fertil ålder måste du läsa informationen nedan innan du börjar att ta mavakamten. Återvänd till denna sida vid behov.

Mavakamten och risken för embryo- och fostertoxicitet (toxicitet för det ofödda barnet)

Mavakamten får inte tas under graviditet eller av kvinnor som kan bli gravida och som inte använder en effektiv preventivmetod, eftersom mavakamten kan skada det ofödda barnet.

Om du kan bli gravid måste du göra ett graviditetstest som är negativt innan du börjar att ta mavakamten. Du måste använda en effektiv preventivmetod under mavakamten-behandlingen och i 6 månader efter din sista mavakamten-dos. Samtala med din läkare om vilken preventivmetod som är lämpligast för dig.

Tala med din läkare om du överväger att försöka bli gravid.

Om du misstänker att du kan vara gravid eller blir gravid medan du tar mavakamten måste du **omedelbart** informera din läkare om det. Läkaren diskuterar i så fall dina behandlingsalternativ med dig.

Den här **Patientguiden** innehåller ett **Patientkort.**

Bär alltid Patientkortet med dig och berätta för all hälso- och sjukvårdpersonal som du besöker att du tar mavakamten.

Patientkortet innehåller information om de huvudsakliga riskerna med mavakamten och kontaktuppgifter till din läkare som förskrivit mavakamten.

CAMZYOS®(mavakamten)
PATIENTKORT

VAD ÄR EKOKARDIOGRAFI, OCH VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Regelbundna ekokardiografier (hjärtultraljud) hjälper din läkare att utvärdera hur mavakamten påverkar ditt hjärta. Ekokardiografi är en ultraljudsundersökning som använder ljudvågor för att skapa bilder av hjärtat. Denna undersökning gör det möjligt för din läkare att bedöma hur ditt hjärta svarar på behandlingen med mavakamten för att säkerställa att du får en gynnsam dos. Utifrån resultaten från ekokardiografin, kan läkaren ändra din dos av mavakamten (höja eller sänka), bibehålla dosen eller pausa eller avbryta behandlingen. Den första ekokardiografi-undersökningen görs innan behandlingen med mavakamten påbörjas. Därefter görs ekokardiografiundersökningar vid uppföljningsbesöken 4, 8 och 12 veckor efter din första dos av mavakamten för att bedöma hur väl du svarar på behandlingen. Rutinmässiga ekokardiografiundersökningar görs därefter var 3:e eller var 6:e månad.

Du kommer också att behöva genomgå ekokardiografiundersökning enligt läkarens anvisningar om din dos av mavakamten ändras eller om dosen av vissa andra läkemedel som du tar ändras.

Det är viktigt att delta i ekokardiografi-undersökningarna enligt instruktionerna från din läkare. Ställ förslagsvis påminnelser i din telefon eller kalender för att hjälpa dig att komma ihåg datum och tid för dina ekokardiografier.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Det finns tre huvudsakliga risker förknippade med behandling med mavakamten:

- Embryo- och fostertoxicitet (toxicitet för det ofödda barnet) (se sidan 2)
- Hjärtsvikt på grund av systolisk dysfunktion; ett tillstånd där hjärtat inte kan pumpa med tillräcklig kraft
- Ökning av mängden mavakamten i kroppen på grund av interaktioner med vissa läkemedel och växtbaserade kosttillskott, vilket kan öka sannolikheten för biverkningar som kan vara allvarliga

Andra eventuella biverkningar relaterade till mavakamten beskrivs i bipacksedeln.

Mavakamten och hjärtsvikt

Hjärtsvikt på grund av systolisk dysfunktion är ett allvarligt och ibland dödligt tillstånd.

Tala om för din läkare eller uppsök vård **omedelbart** om du får nya eller förvärrade symtom på hjärtsvikt, såsom andnöd, bröstsmärta, trötthet, hjärtklappning eller bensvullnad.

Informera din läkare om eventuella nya och befintliga medicinska tillstånd som du har före och under behandlingen med mavakamten.

Mavakamten och interaktioner

Vissa läkemedel, inklusive receptfria läkemedel och vissa växtbaserade kosttillskott, kan påverka mängden av mavakamten i kroppen och öka risken för biverkningar (varav vissa kan vara allvarliga). Berätta för din läkare eller för apotekspersonal om alla receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade kosttillskott som du tar, även om du inte tar dem varje dag. Börja **inte** att ta, sluta **inte** att ta och ändra **inte** dosen av något av dina läkemedel eller växtbaserade kosttillskott utan att prata med din läkare eller med apotekspersonal.

Några exempel på läkemedel som kan påverka hur stor mängd mavakamten som ansamlas i kroppen anges i **tabell 1**. Observera att dessa exempel är vägledande och inte anses utgöra en heltäckande lista över alla möjliga läkemedel som kan passa in i denna kategori. Periodisk användning av läkemedel som kan påverka nivåerna av mavakamten i kroppen, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, växtbaserade kosttillskott och grapefruktjuice, rekommenderas inte.

Tabell 1: Exempel på produkter som kan påverka mavakamten

Produkter	Exempel på behandlade tillstånd
omeprazol, esomeprazol	minskar utsöndringen av magsyra
klaritromycin, rifampicin	bakteriella infektioner
verapamil, diltiazem	hjärtsjukdomar
flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol	svampinfektioner
fluoxetin, fluvoxamin	depression
ritonavir, kobicistat	HIV-infektioner
grapefruktjuice	

NÄR SKA JAG UPPSÖKA VÅRD?

Berätta för hälso- och sjukvårdspersonal som du besöker om eventuella biverkningar av mavakamten, även om sådana biverkningar som inte tas upp i denna **Patientguide**.

Tala om för din läkare eller uppsök vård **omedelbart** om du får nya eller förvärrade symtom på hjärtsvikt, såsom andnöd, bröstsmärta, trötthet, hjärtklappning eller bensvullnad.

YTTERLIGARE INFORMATION

Om du har några frågor eller funderingar om mavakamten, diskutera dem med din läkare, med apotekspersonal eller med annan hälso- eller sjukvårdspersonal som är involverad i din behandling.

© 2026 Bristol Myers Squibb.
Version: 3500-SE-2600014/November 2026