

Patientkort för TALVEY® (talkvetamab)

Bär alltid detta kort med dig.
VISA DETTA KORT för all hälso- och sjukvårdspersonal
involverad i din vård och vid alla sjukhusbesök.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera
ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att
rapportera de biverkningar du eventuellt får till
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala eller via
www.lakemedelsverket.se.

VIK HÄR

TALVEY kan orsaka biverkningar som cytokinfrisättnings-
syndrom (CRS) och neurologisk toxicitet, inklusive immun-
effektorcell-associerat neurotoxicitetssyndrom (ICANS).¹

PATIENTENS NAMN:

VIK HÄR

Viktig säkerhetsinformation för patienter
Uppsök omedelbart vård om du upplever något av följande:

Cytokinfrisättnings- syndrom (CRS)	Neurologisk toxicitet, inklusive ICANS
• Feber • Lågt blodtryck • Frossa • Andningssvårigheter • Trötthet • Huvudvärk • Snabba hjärtslag • Ökad nivå av leverenzymmer i blodet	• Känna sig förvirrad • Känna sig mindre uppmärksam • Känna sig desorienterad (vilsen) • Känna sig sömrig • Känna sig långsam eller ha svårt att tänka • Förändrat tänkande eller minskat medvetande • Förvirring • Svårigheter att tala och förstå tal

VIK HÄR

**VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG: Håll dig i närheten av
vårdinrättningen där du fick TALVEY, för daglig kontroll
i minst 2 dagar efter administreringen av alla doserna
i dosupptrappningsschemat. Ring läkaren eller uppsök
omedelbart akutvård om du har något av symtomen som anges
i detta kort! Dessa är inte alla de biverkningar som TALVEY
eventuellt kan orsaka. Tala om för läkare om du får någon
biverkan som besvärar dig eller inte går över.**

Behandlande läkare

BEHANDLANDE LÄKARES NAMN:	BEHANDLANDE LÄKARES TELEFONNUMMER:
SJUKHUSETS NAMN OCH ADRESS:	TELEFONNUMMER:

VIK HÄR

Uppgifter som fylls i av vårdteamet

Ge detta kort till ditt vårdteam så att de kan fylla i uppgifterna och returnera kortet till dig.

Datum för TALVEY-injektioner (dosupptrappningsschema):

UPPTRAPPNINGSDOS 1
UPPTRAPPNINGSDOS 2
UPPTRAPPNINGSDOS 3
UPPTRAPPNINGSDOS 4*
BEHANDLINGSFAS*

* Endast för dosering varannan vecka.
* För veckovis dosering: efter upptrappningsfasen 0,4 mg/kg en gång i veckan.
För dosering varannan vecka: efter upptrappningsfasen 0,8 mg/kg en gång varannan vecka.

VIK HÄR

Viktig säkerhetsinformation för hälso- och sjukvårdspersonal

CRS och neurologisk toxicitet, inklusive ICANS, kan uppkomma hos patienter som får TALVEY och kan vara dödliga eller livshotande. Majoriteten av dessa händelser som har observerats efter administrering av TALVEY har varit av grad 1 och 2.¹

Utvärdera patienten avseende tecken och symtom på CRS och ICANS. Om patienten rapporterar något av de tecken eller symtom som anges i detta kort, vänligen kontakta den behandlande läkaren omedelbart för ytterligare information.

Se produktresumén för fullständig information.

VIK HÄR

Johnson&Johnson

1. TALVEY produktresumé.

Lokal företrädare:
Janssen-Cilag AB
Tfn: +46 8 626 50 00
jacse@its.jnj.com