

ZEPOSIA® (ozanimod)

Patientkort (för fertila kvinnor)

Patientinformation

Om ZEPOSIA® (ozanimod) tas under graviditet kan det skada det ofödda barnet. Eventuella risker är bland annat missfall och missbildningar.

- Använd inte ozanimod om du är gravid eller ammar, eller kan bli gravid och inte använder en effektiv preventivmetod.
- Innan behandling med ozanimod påbörjas:
 1. kommer läkaren att förklara de eventuella riskerna för fostret om du blir gravid under tiden som du tar ozanimod och regelbundet berätta hur du ska minimera riskerna.
 2. måste du använda en effektiv preventivmetod under tiden som du tar ozanimod och i 3 månader efter att du slutat ta ozanimod.
 3. måste du lämna ett negativt graviditetstest som bekräftas av din läkare, något som sedan upprepas regelbundet.
- Om du blir gravid under behandlingen ska du sluta ta ozanimod. Din läkare kommer att informera dig om de skadliga effekter som ozanimod kan orsaka barnet och du bör genomgå ultraljudsundersökningar.
- Du ska sluta ta ozanimod 3 månader innan du planerar att bli gravid.
- Om du slutar att ta ozanimod ska du omedelbart berätta för din läkare om dina symtom förvärras, eftersom det finns en risk för att dina sjukdomssymtom återkommer.
- Berätta omedelbart för din läkare om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

Kontaktuppgifter till din läkare finns på baksidan av detta patientkort.

Mer information om effekterna och biverkningarna av ozanimod finns i bipacksedeln, som även går att läsa på fass.se (välj ingång för allmänhet).

För ytterligare information eller för att få en kopia av detta dokument, vänligen kontakta medinfo.sweden@bms.com eller besök fass.se (ingång för allmänhet, sök efter ZEPOSIA, klicka på "Viktig patientinformation").

Jag tar ozanimod på recept

Viktiga kontaktuppgifter

Läkare som förskrivit ozanimod:

Namn:

Telefonnummer till mottagningen:

Adress till mottagningen:

.....

Detta riskminimeringsmaterial uppfyller villkoren för marknadsföringstillståndet.

©2025 Bristol Myers Squibb. All Rights Reserved.