



ELREXFIO®

Patientkort

Bär alltid med dig detta kort. **VISA DETTA KORT** för all hälso- och sjukvårdspersonal som är inblandad i din vård och om du besöker akutmottagningen.

**VIKTIG SÄKERHETS-
INFORMATION FÖR
PATIENTER SOM FÅR
BEHANDLING MED ELREXFIO**

FÖR PATIENTEN

ELREXFIO kan orsaka biverkningar som cytokinfrisättningssyndrom (CRS) och neurologisk toxicitet, inklusive immuneffektorcells-associerat neurotoxicitetssyndrom (ICANS).

Ring din vårdgivare eller sök omedelbart akut hjälp om du får något av dessa symtom:

Cytokinfrisättningssyndrom (CRS):

- Feber (38 °C eller högre)
- Andningssvårigheter
- Frossa
- Huvudvärk
- Lågt blodtryck
- Yrsel

- Snabb puls
- Ökad nivå av leverenzymmer i blodet

Neurologisk toxicitet, inklusive ICANS:

- Förvirring
- Känner dig mindre alert
- Svårigheter att tala eller skriva
- Domningar och stickningar eller förlust av känsel

Om du har **något** av ovanstående symtom ska du kontakta läkare eller omedelbart söka akut medicinsk hjälp. Dessa är inte alla möjliga biverkningar från ELREXFIO. Berätta för din läkare om du har något symtom som stör dig eller inte upphör.



Denna patient får ELREXFIO.

**Namn på behandlande läkare
som ger ELREXFIO:**

Telefonnummer (kontor):**Telefonnummer (efter kontorstid):**

Vårdinrättningens namn:

Datum för injektioner med ELREXFIO:

Upptreppningsdos 1:

Upptreppningsdos 2:

Första fulla dosen:

