

Fingolimod - Patientkort med graviditetsinformation

Kontraindikation

FINGOLIMOD KAN SKADA DITT FOSTER OM DET ANVÄNDS UNDER GRAVIDITET.

Fingolimod får inte användas av gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder ett effektivt preventivmedel.

Det är viktigt att du använder en effektiv preventivmetod under behandling med fingolimod och i 2 månader efter avslutad behandling, för att undvika att bli gravid. Tala med din läkare om vilka effektiva preventivmetoder du kan använda.

Innan behandling med fingolimod påbörjas

- Fingolimod är teratogent (en substans som skadar eller ger avvikelser i utvecklingen av embryo eller foster vid exponering av läkemedlet under graviditet, vilket resulterar i fosterskador eller missbildningar).
- När du påbörjar behandlingen kommer din läkare att informera dig om risken för fosterskada och de åtgärder du måste vidta för att minimera denna risk. Informationen kommer att upprepas regelbundet.
- Innan behandlingen påbörjas måste du lämna ett graviditetstest som ska bekräftas vara negativt av en läkare.
- Läkaren kommer att informera dig om att du måste använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och i 2 månader efter avslutad behandling. Tala med din läkare om vilka effektiva preventivmetoder som du kan använda.
- Läs patientguiden om fingolimod som du får av din läkare.

Under behandling med fingolimod

- Kvinnor får inte bli gravida under behandling eller inom 2 månader efter avslutad behandling.
- Kvinnor måste använda en effektiv preventivmetod under behandlingen

samt fortsätta med denna i 2 månader efter avslutad behandling.

- Graviditetstester måste göras regelbundet.
- Din läkare kommer regelbundet att ge dig information om de allvarliga riskerna för fostret vid behandling med fingolimod. Läkaren kommer också att informera om de nödvändiga steg som behöver tas för att minimera risken.
- Om du blir eller vill bli gravid **måste du avsluta behandlingen** med fingolimod.
- Om du tror du är gravid, informera **omedelbart** din läkare. Din läkare kommer att ge dig rådgivning i händelse av graviditet och göra en utvärdering av potentiella följder.

Efter avslutad behandling med fingolimod

- Informera din läkare omedelbart om du tycker att din MS försämras (t.ex. svaghet eller synförändringar) eller om du noterar några nya symtom efter att du har avslutat behandlingen med fingolimod på grund av en graviditet.
- Du måste använda en effektiv preventivmetod i 2 månader efter avslutad behandling med fingolimod eftersom det tar så lång tid för fingolimod att lämna kroppen.

Ytterligare information och frågor

- Du hittar mer information i broschyren "Viktiga saker att känna till gällande behandling med fingolimod" samt i bipacksedeln för fingolimod.
- Om du har frågor gällande din behandling eller innehållet i detta patientkort, vänligen kontakta din vårdgivare.