

Järnkarboximaltos

Viktig information till patienter om den potentiella risken för allvarliga allergiska reaktioner vid användning av parenteralt järn (läkemedel som ges via en nål som förs in i en ven)

Läs denna information noga och diskutera eventuella frågor med din läkare.

Du kan löpa större risk för en allergisk reaktion om du har:

- konstaterade allergier, även läkemedelsallergier
- svår astma, eksem eller andra allergier (till exempel mot damm, pollen, mjäll från husdjur)
- immunologiska eller inflammatoriska sjukdomar (till exempel reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus).

Tala med din läkare innan du ordineras eller ges parenteralt järn om du har någon av ovannämnda allergier eller sjukdomar.

Läkaren avgör om nyttan du får av behandlingen är större än riskerna.

Parenteralt järn får inte ordineras eller ges till dig

- om du är allergisk (överkänslig) mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i läkemedlet
- om du tidigare har fått allvarliga allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner) mot andra parenterala järnpreparat*
- om du har järnöverbelastning (för mycket järn i kroppen)
- om din anemi inte beror på järnbrist.

Tala med din läkare innan du ordineras eller ges parenteralt järn om du har någon av ovannämnda allergier eller sjukdomar.

***Det är viktigt att känna till att en reaktion kan uppkomma även om du inte tidigare har upplevt några problem med parenteralt järn.**

Graviditet: Parenteralt järn ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt. Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid är det viktigt att du diskuterar detta med läkaren.

Kontakta omedelbart läkare eller sjuksköterska

- om du upplever tecken eller symtom på en allergisk reaktion under eller kort efter behandling med parenteralt järn.

Exempel på sådana är nässelutslag eller andra utslag, klåda, yrsel, svimningskänsla, svullnad av läppar, tunga, svalg eller kropp, andningssvårigheter, andfåddhet eller väsande eller pipande andning.

- Läkare eller sjuksköterska kommer att hålla dig under uppsikt avseende tecken och symtom på en allergisk reaktion i minst 30 minuter efter varje dos parenteralt järn som ges till dig.

Parenteralt järn används för att behandla järnbrist när järn som ges via munnen är ineffektivt eller inte kan användas.

Parenteralt järn kan orsaka allergiska reaktioner och måste ges av personal som är utbildad i att bedöma och hantera dessa reaktioner.

Hos några patienter kan dessa allergiska reaktioner bli svåra eller livshotande (så kallade anafylaktiska reaktioner) och orsaka problem med hjärtat och blodtrycket och/eller förlust av medvetandet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.