

Uppsök omedelbart sjukvård om du får någon av dessa biverkningar, eller om de förvärras (forts.):

Problem i andra delar av kroppen (forts.)

- Muskel- och ledproblem
 - Ledsmärta eller svullnad
 - Muskelsmärta, svaghet eller stelhet
- Ögonproblem
 - Synförändringar
 - Ögonsmärta eller röda ögon
 - Ljuskänslighet
- Hjärt- och cirkulationsproblem
 - Ändrade hjärtslag, såsom snabba hjärtslag, eller känslan av att hjärtat hoppar över ett hjärtslag eller dunkande känsla
 - Bröstmärta
 - Andnöd
- Övrigt
 - Torrhet på flera ställen på kroppen såsom muntorrhet, torra ögon, torr i näsan, halsen och torr hud
 - Blåmärken på huden eller blödning, förstörd lever och/eller mjälte, lymfkörtelförstoring

Viktig information till Hälso- och sjukvårdspersonal som behandlar patienten oavsett tillfälle, inklusive vid akutsituationer

Denna patient har fått LIBTAYO förskrivet, en anti PD-1-antikropp. LIBTAYO kan orsaka immunmedierade biverkningar som påverkar hud, lungor, tarmkanal, lever, hormonproducerande körtlar, njurar och andra delar av kroppen. Tidig upptäckt och lämplig hantering är nödvändigt för att minimera konsekvenserna av biverkningarna. Läs LIBTAYOs produktresumé för detaljerad information om upptäckt och hantering av biverkningar.

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta- riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet, www.lakemedelsverket.se.

Viktig kontaktinformation

Läkarens namn

Läkarens telefonnummer

Mitt namn

Mitt telefonnummer

Min kontaktperson vid nödsituationer

Telefonnummer till min kontaktperson vid nödsituationer

REGENERON

© 2026 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. All rights reserved. Utbildningsmaterial, ND-CEM-MI-24-02-0003, 03/2026

Patientkort

LIBTAYO®

(cemiplimab)

Viktig säkerhetsinformation för att minimera risken för immunmedierade biverkningar

Detta Patientkort hjälper dig att identifiera och rapportera symtom på biverkningar från din behandling med LIBTAYO®.

Detaljerad information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida: www.lakemedelsverket.se. För ytterligare information, läs bipacksedeln på www.fass.se eller kontakta Regeneron för medicinsk information på 020 1604 786 eller via e-post: medical.information_global@regeneron.com

Viktig information

- Berätta för din läkare om alla dina sjukdomstillstånd och om alla läkemedel som du använder, innan du tar LIBTAYO.
- LIBTAYO kan orsaka allvarliga biverkningar som kan förvärras.
- Rapportera alla biverkningar till din läkare, även om de inte finns nämnda i detta Patientkort.
- Vänta inte med att rapportera biverkningar till din läkare, även om du är bortrest.
- Försök inte behandla dessa biverkningar själv utan att först konsultera din läkare.
- Ha alltid med dig detta Patientkort under behandlingstiden.
- Visa detta Patientkort för all Hälso- och sjukvårdspersonal du besöker, utöver läkaren som forskrev LIBTAYO åt dig.

Uppsök omedelbart akut sjukvård om du får någon av dessa biverkningar, eller om de förvärras:

Hudproblem

- Utslag eller klåda
- Spruckna blåsor på huden
- Sår i munnen eller sår i andra slemhinnor

Problem med lungorna (lunginflammation)

- Ny eller förvärrad hosta
- Andningssvårigheter
- Bröstsmärta

Inflammation i tarmarna (kolit)

- Frekvent diarré, ofta blod- eller slemblandad
- Fler avföringar än vanligt
- Svart eller tjärliknande avföring
- Kraftig magsmärta eller ömmande mage

Inflammation i levern (hepatit)

- Guldfärgning av hud eller ögonvitor
- Kraftigt illamående eller kräkningar
- Smärta på höger sida av magen (i tarmarna)
- Trötthet
- Mörkfärgad urin (tefärgad)
- Lättare att få blåmärken eller blödningar än vanligt
- Mindre aptit än vanligt

Problem i hormonproducerande körtlar

- Huvudvärk som inte försvinner eller ovanlig huvudvärk
- Snabba hjärtslag
- Ökad svettning
- Känna sig mer frusen eller varm än vanligt
- Kraftig trötthet
- Yrsel eller svimning
- Viktökning eller viktnedgång
- Ökad hunger eller törst

- Håravfall
- Förstoppning
- Mörkare röst
- Mycket lågt blodtryck
- Behov av att kissa oftare
- Illamående eller kräkningar
- Magsmärta (buksmärta)
- Ändrad sinnesstämning eller beteende (såsom minskad sexuell lust, varairriterad eller glömsk)

Symtom vid diabetes typ 1, eller diabetesketoacidosis

- Ökad aptit eller överdriven törst
- Behov av att kissa oftare
- Viktnedgång
- Trötthetskänsla eller illamående
- Magsmärta
- Snabb och djup andning
- Förvirring
- Ovanlig sömnhet
- Sötaktig andedräkt, en söt eller metallisk smak i munnen eller annorlunda lukt på urin eller svett

Problem med njurarna (njurinflammation och njursvikt)

- Behov av att kissa mer sällan än vanligt
- Blodblandad urin
- Svullna fötter eller underben
- Minskad aptit

Reaktioner i samband med infusion (kan vara allvarliga eller livshotande)

- Frossa
- Skakningar eller feber
- Klåda eller utslag
- Rodnat eller svullet ansikte
- Andningssvårigheter eller väsande andning
- Yrsel eller svimningskänsla
- Smärta i rygg eller nacke
- Illamående
- Kräkningar
- Buksmärta

Problem i andra delar av kroppen

- Problem i nervsystemet
 - Huvudvärk eller nackstelhet
 - Feber
 - Trötthetskänsla eller svaghet
 - Frossa
 - Kräkningar
 - Förvirring
 - Problem med minnet eller trötthetskänsla
 - Ryckningar (krampanfall)
 - Se och höra saker som inte är verkliga (hallucinationer)
 - Kraftig muskelsvaghet
 - Stickningar, domningar, svaghet eller brännande smärta i armar eller ben
 - Förflamning i extremiteterna