

Patientkort

Teriflunomide Vivanta

Patientens namn:_____

Datum, första förskrivning av Teriflunomide Vivanta:_____

Klinikens namn:_____

Namn på behandlande läkare:_____

Telefonnummer till behandlande läkare:_____

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste vara medveten om när du behandlas med Teriflunomide Vivanta. Visa detta kort för alla läkare och all annan vårdpersonal som är involverade i din medicinska vård (till exempel vid olycksfall). Var god läs bipacksedeln för fullständig information. För ytterligare information, se www.fass.se

Viktiga biverkningar

Teriflunomid minskar aktiviteten i immunsystemet (immunmodulator). Hos vissa personer kan teriflunomid orsaka leverskador (hepatit) och kan även minska produktionen av vita blodkroppar som bekämpar infektioner (neutrofiler) och blodplättar som medverkar i blodkoagulationen.

Leverfunktionsprover och blodtryck ska kontrolleras regelbundet under behandlingen med teriflunomid och vid behov ska komplett blodstatus tas. Dessa tester bör också göras innan behandlingen påbörjas.

Kontakta din läkare omedelbart om du har någon av följande biverkningar:

- Din hud eller ögonvitor gulfärgas, mörk urin, illamående, kräkningar eller buksmärta. Detta kan betyda att du kan ha problem med levern.
- Hög feber, hosta, frossa, svullna körtlar, reducerat eller smärtsamt urinflöde. I detta fall kan du ha en infektion.

För fertila kvinnor, inklusive flickor och deras föräldrar/vårdnadshavare:

- Teriflunomid ska inte användas under graviditet eller av fertila kvinnor som inte använder ett effektivt preventivmedel, eftersom läkemedlet kan orsaka allvarliga fostermissbildningar.
- Börja inte ta teriflunomid om du är gravid eller tror att du kan vara gravid. Läkaren kanske ber dig göra ett graviditetstest för säkerhets skull.
- Effektiva preventivmedel ska användas under och efter behandling med teriflunomid tills koncentrationen i blodet är låg. Läkaren kommer att informera om de möjliga riskerna för ett foster och om behovet av att använda effektiva preventivmedel.
- Tala om för läkaren om du vill byta preventivmetod eller planerar att bli gravid efter att behandlingen med teriflunomid har avslutats. Diskutera också med din läkare om du planerar att amma eller om du ammar.
- Om du misstänker att du har blivit gravid medan du tar teriflunomid eller inom två år efter avslutad behandling måste du omedelbart kontakta din läkare för att göra ett graviditetstest. Om testet bekräftar att du är gravid kan läkaren föreslå behandling med vissa läkemedel för att

påskynda utrensningen av teriflunomid ur kroppen eftersom man då kan minska risken för ditt barn.

- Föräldrar eller vårdnadshavare till en flicka ska kontakta flickans läkare när hon får sin första menstruation, så att hon kan få information om risken för fostermissbildningar under en graviditet och råd om lämpliga preventivmedel.

Rapportering av biverkningar

Om du märker några biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Du kan också rapportera biverkningarna direkt till Läkemedelsverket:

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala www.lakemedelsverket.se