

INNEHAVAREN AV DETTA KORT BEHANDLAS MED HULIO



adalimumab (TNF hämmare)

**Patientkort -
för användning till vuxna**

Information för dig och vårdpersonal involverad i din medicinska vård eller behandling.

**Detta kort innehåller utvald viktig säkerhets-
informationsom du måste känna till före och
under din behandling med Hulio.**

- Ha kortet med dig hela tiden och under 4 månader efter din sista injektion med Hulio.
- Visa detta kort för läkare eller sjukvårds-personal som du besöker.
- Skriv upp information om tuberkulostest eller tuberkulosbehandlingar som du fått i detta kort.

Alla eventuella biverkningar finns inte med på kortet. För utförlig information om Hulio, läs bipacksedeln som finns i Hulioförpackningen eller tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

1. Inledning

Hulio är ett läkemedel som är avsett för behandling av vissa sjukdomar som påverkar en del av immunsystemet. Även om Hulio kan vara effektivt vid behandling av dessa sjukdomar, kan vissa personer drabbas av en eller flera biverkningar. Det är viktigt att du talar med läkare om eventuella fördelar med behandlingen och om biverkningar som kan uppstå när du tar Hulio. Dessa kan variera från person till person.

Syftet med detta kort är att informera dig om några av de eventuella biverkningarna av Hulio.

- Några av de allvarliga biverkningarna som kan uppträda är infektioner, cancer och besvär i nervsystemet.
- Alla eventuella biverkningarna av Hulio finns inte med på kortet

För att säkerställa att Hulio verkar på rätt sätt och är säkert för dig ska du regelbundet träffa läkaren för att diskutera hur du mår. Tala genast om för läkaren om det sker förändringar i ditt tillstånd.

2. Före behandling med Hulio

Berätta för läkaren om eventuella hälsoproblem och alla läkemedel som du tar. Detta hjälper dig och läkaren att avgöra om Hulio är rätt för dig.

Tala om för läkaren ditt barn:

- Om du har en infektion eller symtom på en infektion (såsom feber, sår, trötthetskänsla, tandproblem)
- Om du har tuberkulos eller har varit i nära kontakt med någon som har tuberkulos
- Om du har eller har haft cancer
- Om du har domningar eller stickningar eller har något problem som påverkar nervsystemet, såsom multipel skleros.

Läkaren ska också kontrollera dig med avseende på tecken och symtom på tuberkulos före Hulio sätts in. Du kan behöva behandlas för tuberkulos innan du börjar ta Hulio.

Vaccinationer

Under behandlingen med Hulio kan du vaccinera dig, men inte med vacciner som innehåller levande virus/bakterier.

Om du har fått Hulio under din graviditet, är det viktigt att du berättar detta för barnläkaren innan det nyfödda barnet vaccineras. Barnet ska inte få levande vaccin t ex BCG (används för att förebygga tuberkulos), förrän fem månader efter den sista Hulioinjektionen under graviditeten.

3. Vid behandling med Hulio

Informera läkaren hur du tycker att Hulio fungerar för dig.

- **Det är viktigt att genast berätta för läkaren om du får ovanliga symtom.** Detta bidrar till att du får rätt vård. Det minskar också risken för att biverkningarna förvärras.
- Många biverkningar, även infektioner, kan behandlas om du omedelbart informerar läkaren.
- Om du får en biverkning kommer läkaren att avgöra om du ska fortsätta eller avbryta behandlingen med Hulio. Det är viktigt att du pratar med läkaren för att ta reda på vad som är rätt för dig.
- Eftersom biverkningar fortfarande kan uppstå efter din sista dos av Hulio, berätta för läkaren om alla symtom som du eventuellt har i upp till 4 månader efter din sista injektion med Hulio.

Berätta för läkaren om:

- eventuella nya sjukdomstillstånd
- nya läkemedel du börjar ta
- eventuella planerade ingrepp eller operationer.

4. En del personer som tar Hulio kan få allvarliga biverkningar, t.ex.:

Infektioner: Hulio hjälper personer med vissa inflammatoriska sjukdomar. Detta sker genom att Hulio blockerar en del av immunsystemet. Denna del av immunsystemet bekämpar även infektion. Det innebär att Hulio sannolikt ökar risken för infektioner eller kan förvärra en befintlig infektion. Detta gäller även infektioner såsom förkylning eller allvarigare infektioner såsom tuberkulos.

Cancer: Hulio kan öka risken för vissa typer av cancer.

Besvär i nervsystemet: Vissa personer har utvecklat nya eller förvärrade besvär i nervsystemet med Hulio, t.ex. multipel skleros.

Läs Hudios bipacksedel för mer information.

De biverkningar som anges här är inte alla eventuella biverkningar som kan förekomma vid behandling med Hulio.

5. Ring läkaren eller uppsök omedelbar läkarvård om du får något av följande symtom på dessa allvarliga biverkningar:

Infektioner: feber, frossa, kraftig svettning, sjukdomskänsla eller ovanligt kraftig trötthet, illamående eller kräkning, diarré, magsmärta, aptitlöshet eller viktninskning, hosta och blodiga eller slemmiga upphostningar, andfåddhet, urineringssvårigheter, sår, muskelvärk, tandbesvär.

Cancer: nattliga svettningar, svullnad av lymfknutorna i halsen, armhålorna, ljumskarna eller andra kroppsdelar, viktninskning, nya hudlesioner (skador) eller förändringar av befintliga hudlesioner (t.ex. födelsemärken eller fräknar), svår, oförklarlig klåda.

Besvär i nervsystemet: domningar eller stickningar, synförändringar, muskelsvaghet eller oförklarad yrsel.

Informera läkaren om alla ovanliga symtom du får vid behandling med Hulio. De symtom som listas här är inte alla eventuella symtom på dessa biverkningar.

6. Information till dig och sjukvårds - personal som deltar i din medicinska vård eller behandling

Ditt namn:

Läkarens namn
(förskrivaren av Hulio):

Läkarens telefonnummer:

Indikation:

Datum för din första
injektion med Hulio:

Din dos av Hulio:

Datum för din sistainjektion med Hulio
(om du inte längre tar Hulio):

7. Tuberkulostest och behandling av tuberkulos

Kryssa i rutan om ditt barn någon gång har
testats för tuberkulos:

☐ JA (kontrollera med läkaren om du inte vet)

Kryssa i rutan om ditt barn någon gång har
testat positivt för tuberkulos:

☐ JA (kontrollera med läkaren om du inte vet)

Kryssa i rutan om ditt barn någon gång har
tagit läkemedel för att behandla eller förebygga tuberkulos:

☐ JA (kontrollera med läkaren om du inte vet)

Läs Hulus bipacksedel för ytterligare information. Om du har andra frågor, tala med ditt barns läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Biosimilar Collaborations Ireland Limited
E: medical.informationEU@biocon.com
T: 0080008250910