

Patientinformation Agomelatin -rekommendation för att undvika leverpåverkan

Agomelatin kan orsaka biverkningar som kan innebära förändringar i din leverfunktion. Denna handbok innehåller rekommendationer för att undvika leverbiverkningar samt råd om vad du kan göra om sådana biverkningar uppstår under behandlingen med agomelatin.

Rådfråga din läkare för mer information.

Agomelatin är ett antidepressivt läkemedel som kan användas för att behandla depression. För att få bäst nytta av ditt läkemedel, följ läkarens anvisningar om hur du ska ta agomelatin (dos, behandlingens längd, uppföljningsbesök, blodprov).

Läs bipacksedeln som finns i agomelatinförpackningen för ytterligare information.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Du kan också rapportera biverkningar direkt till LäkeMedelsverket: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Innan du börjar ta agomelatin

- Tala om för din läkare om du har leverproblem: ta inte agomelatin om så är fallet.
- Det kan även finnas andra orsaker till att agomelatin inte är lämplig för dig. Fråga din läkare om råd:
 - Om du någon gång har haft leverproblem
 - Om du har fetma eller är överviktig
 - Om du har diabetes
 - Om du dricker alkohol
 - Om du tar andra läkemedel (vissa andra mediciner vet man påverkar levern)

Vad ska man göra för att undvika leverproblem under behandlingen

- Gå regelbundet på blodprovstagning

Varför?

Din läkare kommer att kontrollera med blodprov att din lever fungerar ordentligt **före behandlingen påbörjas**. Resultaten kommer att berättas för läkaren **hur bra din lever fungerar** och om agomelatin är lämplig för dig.

Vissa patienter kan få förhöjda nivåer av leverenzymerna i blodet vid behandlingen med agomelatin. Nivåerna av dessa leverenzymerna visar om levern fungerar ordentligt och är nödvändiga för att läkaren ska kunna följa upp din behandling.

När?

	Före behandlingen startar eller vid dosökning	Efter ca 3 veckor	Efter ca 6 veckor	Efter ca 12 veckor	Efter ca 24 veckor
Blodprover	✓	✓	✓	✓	✓

Om din läkare ökar dosen till 50 mg måste samtliga blodprover tas på nytt.

Hur?

Kom ihåg att ha dig sidan med SCHEMA MED TIDER FÖR BLODPROVSTAGNING (se nästa sida) till din läkare.

Informera omedelbart med din läkare om du får veta att dina leverenzymerna i blodet ökar under behandlingen.

Var uppmärksam på tecken på leverproblem

Om du observerar något av följande är det möjligt att din lever inte fungerar ordentligt:

- gul hud / gula ögon
- ovanligt mörk urin
- ljus avföring
- smärta i övre, högra delen av buken (magen)
- onormal trötthet (speciellt i samband med andra symptom som anges ovan)

Ta kontakt med din läkare omedelbart om du får något tecken på leverpåverkan (se ovan) för att veta om du ska avbryta din agomelatinbehandling eller inte.

SCHEMA MED TIDER FÖR BLODPROVSTAGNING

KOM IHÅG

När du tar agomelatin är det viktigt att du tar regelbundna blodprov.

Tabeller nedan hjälper dig att komma ihåg när du ska lämna blodprover.

Agomelatin 25 mg - Datum för första intag:	
Blodprov för uppföljning av leverenzymmer	Datum
1:a blodprovet (före behandlingsstart)	
2:a blodprovet (efter ca 3 veckor)	
3:e blodprovet (efter ca 6 veckor)	
4:e blodprovet (efter ca 12 veckor)	
5:e blodprovet (efter ca 24 veckor)	

Din läkare kan besluta att du behöver lämna ytterligare blodprover.

Dosökning till 50 mg - Datum för första intag:	
Blodprov för uppföljning av leverenzymmer	Datum
1:a blodprovet (behandlingsstart med agomelatin 50 mg)	
2:a blodprovet (efter ca 3 veckor)	
3:e blodprovet (efter ca 6 veckor)	
4:e blodprovet (efter ca 12 veckor)	
5:e blodprovet (efter ca 24 veckor)	

Kom ihåg att ta med detta schema när du besöker din läkare.

Detta material har utarbetats av Viatrix AB

Version 3.0 / Aug-2024