

UTBILDNINGS- OCH DISKUSSIONSGUIDE FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL:

- Diskutera följande risker med patienten/föräldern/vårdnadshavaren, förklara varför övervakningen krävs och informera om vad de ska göra om patienten får vissa tecken och symtom

Patientens namn:		Patientens ålder:	
Datum för första besök:		Patientens kön: ☐ Man ☐ Kvinna	
Datum för första förskrivning:		Dagens datum:	

DISKUSSION

- Läs produktresumén för fullständig förskrivningsinformation

Risk för hematologisk påverkan

- ☐ Risk för minskat antal blodkroppar (påverkar främst vita blodkroppar)
- ☐ Fullständig blodstatus före behandlingsstart och därefter vid behov, baserat på kliniska tecken och symtom under behandlingen

Risk för hypertoni

- ☐ Kontrollera blodtrycket före behandlingsstart och med jämna mellanrum under behandlingen
- ☐ Förhöjt blodtryck bör hanteras på lämpligt sätt före och under behandlingen

Risk för leverpåverkan

- ☐ Kontrollera leverfunktionen före behandlingsstart och med jämna mellanrum under behandlingen
- ☐ Patienterna ska informeras om tecken och symtom på leverpåverkan och uppmanas att omedelbart kontakta sin läkare om de får sådana symtom

Risk för allvarliga infektioner

- ☐ Patienterna ska uppmanas att kontakta sin läkare omedelbart om de får tecken eller symtom på infektion
- ☐ Patienterna ska också informeras sin läkare om de ordineras eller tar andra läkemedel som påverkar immunsystemet
- ☐ Överväg att sätta in en accelererad elimineringsprocedur om patienten får en allvarlig infektion

Risk för teratogenicitet

- ☐ Informera kvinnor i fertil ålder om att teriflunomid kan orsaka allvarliga missbildningar och därför är kontraindicerat vid graviditet, och att de måste använda ett effektivt preventivmedel under och efter behandlingen tills mängden teriflunomid i blodet sjunkit till en låg nivå. Kvinnor ska omedelbart kontakta sin läkare om de planerar att bli gravida eller att avsluta eller byta preventivmedel under denna tid.
- ☐ Kontrollera risken för graviditet hos alla kvinnliga patienter före och under behandling
- ☐ Uppmana föräldrar/vårdnadshavare till flickor att kontakta sin läkare för information om risken för teratogenicitet och rådgivning om preventivmedel när flickan börjar menstruera
- ☐ Om kvinnor blir gravida ska de omedelbart kontakta sin läkare och sluta att ta teriflunomid. Läkaren kommer att diskutera och överväga att sätta in en accelererad elimineringsprocedur.

Patientkort:

- Ge patienten patientkortet och ta upp innehållet till diskussion med jämna mellanrum, vid varje konsultation och **minst en gång om året under behandlingen**
- Fyll i dina kontaktuppgifter på patientkortet och byt ut vid behov
- Uppmana patienten att visa detta kort för läkare och annan sjukvårdspersonal som har hand om patientens medicinska vård (t.ex. i akutsituationer)
- Rekommendera patienten att kontakta sin förskrivare eller vårdcentralsläkare om de utvecklar tecken eller symtom på de risker som beskrivs på patientkortet
- Före behandlingsstart och regelbundet därefter ska du ge rådgivning och information till kvinnor i fertil ålder, inklusive ungdomar/föräldrar/vårdnadshavare, om den potentiella risken för fosterskador
- Säkerställ att patienterna övervakas i tillräcklig utsträckning vid nya förskrivningar, inkluderande kontroll av biverkningar samt riskbedömning och prevention

Patienten har informerats om och förstår ovannämnda risker och fördelar med denna behandling

Förskrivarens namn:

Förskrivarens underskrift:

Vid rapportering, uppgi så mycket information som möjligt. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Misstänkta biverkningar ska också rapporteras till

Tel: +46 8 624 00 25
e-mail: medinfo_nordic@accord-healthcare.com

RÅDGIVNING OCH ÖVERLÄMNING