

Patientkort

Sida 1

För behandling av pulmonell arteriell hypertension (høgt blodtryck i lungorna) Det här kortet innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till när du behandlas med Yuvanci. Bär alltid med dig det här kortet och visa det för alla läkare som är involverade i din vård. Yuvanci® 10 mg/20 mg Yuvanci® 10 mg/40 mg macitentan/tadalafil filmdragerade tabletter SV	Det är viktigt att du omedelbart rapporterar graviditet eller eventuella biverkningar som kan uppstå under behandling med Yuvanci till din förskrivande läkare. Vårdinrättning Namn på förskrivande läkare: Telefonnummer till förskrivande läkare:
--	--

Sida 2

Sida 3

Graviditet Yuvanci kan skada utvecklingen av fostret. Därför ska du inte ta Yuvanci om du är gravid och du ska heller inte bli gravid medan du tar Yuvanci. Dessutom, om du har pulmonell arteriell hypertension, kan en graviditet allvarligt försämra dina sjukdomssymtom.	Preventivmedel Du måste använda ett tillförlitligt preventivmedel medan du tar Yuvanci. Tala med din läkare om du har frågor om detta. Du måste göra ett graviditetstest innan du börjar ta Yuvanci och varje månad under behandlingen, även om du tror att du inte är gravid.
---	--

Sida 4

Sida 5

Liksom andra läkemedel i denna grupp kan Yuvanci påverka levern. Din läkaren kommer att ta blodprover innan du påbörjar behandling med Yuvanci och under behandlingen, för att kontrollera om din leverfunktion är normal. Tecken på att din lever kanske inte fungerar normalt kan vara: • illamående (önskan att kräkas) • kräkningar • feber (hög temperatur) • mag-/buksmärta • gulsot (gulfärgning av huden och ögonvitor) • mörkfärgad urin • kliande hud • dvalliknande tillstånd eller trötthet (ovanlig trötthet eller utmattning) • influensaliknande syndrom (led- och muskelsmärter med feber)	Om du märker något av dessa tecken ska du omedelbart tala om detta för din läkare. Om du har frågor om din behandling, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
--	--

Sida 6