

Telefonnummer till behandlande läkare:

Namn på behandlande läkare:

Klinikens namn:

Datum, första förskrivning av Aubagio (teriflunomid):

Patientens namn:

PATIENTKORT

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste vara medveten om när du behandlas med Aubagio®. Var god läs bipacksedeln för fullständig information.



Allmänna anvisningar

Visa detta kort för alla läkare och all annan vårdpersonal som är involverade i din medicinska vård (till exempel vid olycksfall).

Utbildningsmaterial, version 5, december 2024.

AUBAGIO
(teriflunomid)

SANOFI AB, Box 30052, 104 25 Stockholm
Tel: 08-634 50 00. www.sanofi.se

sanofi
VV-PV-0553622



Viktiga biverkningar

Detta läkemedel kan påverka leverns funktion, ditt blodtryck och vissa celler i blodet som är viktiga för att bekämpa infektioner.

Kontakta din läkare omedelbart om du har någon av följande biverkningar:

- Din hud eller ögonvitor guldfärgas, mörk urin, illamående, kräkningar eller buksmärta. Detta kan betyda att du kan ha problem med levern.
- Hög feber, hosta, frossa, svullna körtlar, reducerat eller smärtsamt urinflöde. I detta fall kan du ha en infektion.



För kvinnor i fertil ålder, inklusive flickor och deras föräldrar/vårdnadshavare

- Börja inte med Aubagio när du är gravid eller om du tror att du kan vara gravid. Din läkare kan be om ett graviditetstest för att bekräfta.
- Använd ett tillförlitligt preventivmedel när du tar Aubagio. Din läkare kommer informera om potentiella risker för ett foster och om behovet av en effektiv preventivmetod.
- Kontakta din läkare om du vill ändra preventivmetod eller om du vill bli gravid.
- Om du blir gravid eller tror att du är gravid, sluta ta teriflunomid och **kontakta din läkare omedelbart**.
- Vid graviditet kan din läkare rekommendera behandling med särskilda läkemedel för att snabbt och effektivt utsöndra Aubagio ur din kropp.
- Du ska även diskutera med din läkare om du ammar/planerar att amma.
- Till föräldrar/vårdnadshavare eller flickor: kontakta din läkare när patienten får sin första menstruation för att få rådgivning om den potentiella risken för fostret och behovet av preventivmedel.