

Graviditetspreventionsprogram

Riskmedvetandeformulär

Denna Riskmedvetandeformulär är avsedd för att stödja dig vid patientrådgivning innan patienten påbörjar behandling med Lenalidomide Grindeks för att säkerställa att läkemedlet används korrekt och på ett säkert sätt.

Det är inte ett avtal och fritar inte någon från sitt ansvar med avseende på säker användning av produkten och förebyggande av fosterexponering.

Patientuppgifter

Patientens förnamn	
Patientens efternamn	
Patientens underskrift	
Datum för rådgivning	

Förskrivarens uppgifter

Förskrivaren förnamn	
Förskrivaren efternamn	
Förskrivaren underskrift	
Datum	

Välj den kolumn som passar patientens riskkategori och referera till de angivna rådgivningsmeddelanden.

Har du informerat din patient:	Manliga patienter	Icke fertila kvinnor*	Fertila kvinnor
Att det är viktigt att undvika fostrexponering			
Om att hon inte får ta lenalidomid om hon är gravid eller planerar att bli det?	Ej relevant	Ej relevant	
Så att hon förstår att det är viktigt att undvika lenalidomid under graviditet och att använda effektiva preventivmedel** utan avbrott, minst 4 veckor innan behandlingen påbörjas, under hela behandlingen och i minst fyra veckor efter avslutad behandling	Ej relevant	Ej relevant	
Att hon ska informera följande läkare om hon behöver byta eller avsluta sin preventivmetod: a) läkaren som förskriver hennes preventivmedel om att hon tar lenalidomid b) läkaren som förskriver lenalidomid om att hon har slutat använda eller bytt sin preventivmetod	Ej relevant	Ej relevant	
Att det är viktigt med graviditetstester (dvs. före behandling) minst var fjärde vecka under behandling och efter behandling	Ej relevant	Ej relevant	
Att det är viktigt att omedelbart avsluta lenalidomid vid misstanke om graviditet	Ej relevant	Ej relevant	
Att det är viktigt att omedelbart kontakta sin läkare vid misstanke om graviditet	Ej relevant	Ej relevant	
Att inte dela läkemedlet med någon annan person			
Att inte ge blod under behandlingen (inklusive under dosavbrott) och i minst 7 dagar efter utsättning av lenalidomid			
Att lämna tillbaka de oanvända kapslarna till apoteket efter avslutad behandling			

Att lenalidomid återfinns i sädesvätska, så det finns ett behov av att använda kondom om sexpartnern är gravid eller kan bli gravid och inte använder ett effektivt preventivmedel (även om mannen har genomgått vasktomi)		Ej relevant	Ej relevant
Att han omedelbart ska informera sin behandlande läkare om hans partner blir gravid och alltid använda kondom		Ej relevant	Ej relevant
Att han inte ska donera sädesvätska under behandling (inklusive under dosavbrott) och i minst 7 dagar efter utsättning av lenalidomid		Ej relevant	Ej relevant

* Se broschyren för sjukvårdspersonal för kriterier för att avgöra om en patient är en icke fertil kvinna.

** Se broschyren för sjukvårdspersonal för information om preventivmetoder

Kan du bekräfta att din patient:	Manliga patienter	Icke fertila kvinnor*	Fertila kvinnor
Vid behov remitterades för rådgivning om preventivmetoder?	Ej relevant	Ej relevant	
Klarar av att tillämpa en preventivmetod?		Ej relevant	
Har samtyckt till att göra graviditetstester minst var fjärde vecka förutom vid bekräftad tubarsterilisering?	Ej relevant	Ej relevant	
Gjorde ett graviditetstest med negativt resultat innan behandlingen påbörjades, även vid fullständig och konstant sexuell avhållsamhet?	Ej relevant	Ej relevant	

* Se broschyren för sjukvårdspersonal för kriterier för att avgöra om en patient är en icke fertil kvinna.

BEHANDLING AV FERTILA KVINNOR KAN INTE INLEDAS FÖRRÄN PATIENTEN HAR ANVÄNT MINST EN EFFEKTIV PREVENTIVMETOD I MINST 4 VECKOR INNAN BEHANDLINGEN PÅBÖRJAS ELLER HAR FÖRBUNDIT SIG TILL FULLSTÄNDIG OCH KONTINUERLIG SEXUELL AVHÅLLSAMHET SAMT HAR GENOMGÅTT ETT GRAVIDITETSTEST MED NEGATIV RESULTAT!