

Natriumoxibat är CNS-dämpande med välkänd potential för missbruk. Det finns fall av beroende efter olaglig användning av natriumoxibat.

Du får inte dricka alkohol medan du tar detta läkemedel, då dess effekter kan förstärkas.

För ytterligare information: Läs bipacksedeln för Natriumoxibat Kalceks som finns i lådan med Natriumoxibat Kalceks och prata med din läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar


Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Doseringsanvisning samt viktig information om risker vid behandling med Natriumoxibat Kalceks

Din Natriumoxibat Kalceks kartong innehåller en flaska Natriumoxibat Kalceks oral lösning, en flaskadapter att trycka fast, en graderad doseringsspruta, två 90 ml doseringskoppar med barnsäkra lock att använda vid förberedelse och lagring av dina två kväldsdoser samt patientinformation. Varje uppmätt dos av Natriumoxibat Kalceks måste tömmas i doseringskoppen och spädas ut med 60 ml vatten före intag.



Vänligen läs patientinformationen för ytterligare viktig information innan du tar dina första doser av Natriumoxibat Kalceks. Ta alltid Natriumoxibat Kalceks exakt enligt din läkares anvisningar.

Om du har några ytterligare frågor eller funderingar om Natriumoxibat Kalceks, kontakta din läkare.

Beredning av Natriumoxibat Kalceks.

Natriumoxibat ska tas genom munnen två gånger varje natt. Ta den första dosen när du går till sängs och den andra dosen 2,5 till 4 timmar senare. Du behöver förbereda båda doserna innan du går och lägger dig. Doserna ska tas inom 24 timmar efter beredning.

Steg 1 (Figur 1)

Ta av flaskans lock genom att trycka ned och vrida locket moturs (mot vänster). Efter att du tagit av locket ska flaskan ställas upprätt på en bordsskiva. Håll flaskan i upprätt läge och tryck samtidigt in flaskadaptern i flaskans hals. Detta behöver bara göras första gången flaskan öppnas. Adaptern kan sedan bli kvar i flaskan för all senare användning.

Figur 1



Steg 2 (Figur 2)

För därefter in doseringssprutans spets i flaskans mittöppning och tryck stadigt nedåt. Se till att doseringssprutan är ordentligt fixerad.


Figur 2



Steg 3 (Figur 3)

För att fylla sprutan, vänd flaskan upp och ner. Medan du håller sprutan på plats, dra läkemedlet till den ordinerade dosen genom att försiktigt dra ner kolven.


Figur 3



Steg 4 (Figur 4)

Vänd flaskan till upprätt läge. Ta bort sprutan från flaskans mittöppning. Töm läkemedlet från sprutan i en av de tillhandahållna doseringskopparna genom att trycka ned kolven. Upprepa detta steg med den andra doseringskoppen. Tillsätt därefter cirka 60 ml vatten till varje doseringskopp (60 ml är omkring fyra matskedar).

Figur 4



Steg 5 (Figur 5)

Sätt på de medföljande locken på doseringskopparna och vrid varje lock medurs (mot höger) tills det klickar och låser sig i barnskyddande läge. Skölj ur sprutan med vatten.

Figur 5



Steg 6 (Figur 6)

Strax innan du lägger dig ska du ställa din andra dos intill din säng. Du kan behöva ställa en väckarklocka så att du vaknar för att ta den andra dosen tidigast 2,5 timmar och senast 4 timmar efter din första dos. Ta av locket från den första doseringskoppen genom att trycka ned den barnskyddande låsfliken och vrida locket moturs (mot vänster). Drink hela den första dosen medan du sitter i sängen, sätt tillbaka locket på koppen, och lägg dig sedan genast ned.

Figur 6



Steg 7

När du vaknar 2,5 till 4 timmar senare tar du av locket från den andra doseringskoppen. Drink hela den andra dosen medan du sitter i sängen och direkt innan du lägger dig ned för att fortsätta sova. Sätt tillbaka locket på den

Natriumoxibat Kalceks har potential att inducera andningsdepression.

De allvarligaste biverkningarna är depression/självmodsförsök, psykos och kramper.

Symtom på en överdos av läkemedel kan inkludera: varierande grad av sänkt medvetande vilken snabbt kan fluktuera mellan ett förvirrat, upprört stridslustet sinne och ataxi och koma. Kräkningar (även vid nedsatt medvetenhet), diafores, huvudvärk och nedsatt psykomotorisk förmåga har observerats.