

7. Vilka andra viktiga saker behöver jag veta om att ta Natriumoxibat Kalceks?

- Dela inte Natriumoxibat Kalceks med någon.
- Använd endast den dos som din läkare skrivit ut till dig. Om du anser att dosen behöver ändras, kontakta din läkare.
- Var noga med att vänta minst 2 timmar efter en måltid innan du tar Natriumoxibat Kalceks.
- Natriumoxibat ska tas genom munnen två gånger varje natt. Ta den första dosen när du går till sängs och den andra dosen 2,5 till 4 timmar senare.
- Doserna ska intas inom 24 timmar efter beredning
- Förvara alltid Natriumoxibat Kalceks på en säker plats i originalförpackningen.
- Förvara Natriumoxibat Kalceks utom syn- och räckhåll för barn
- Lämna tillbaka oanvänt läkemedel till ditt apotek.
- Tala omedelbart om för din läkare om du upplever ovanliga symptom som till exempel konstiga tankar, inklusive tankar på att skada andra, medan du tar Natriumoxibat Kalceks.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Vanliga frågor om Natriumoxibat Kalceks

Här är några frågor som du kanske har angående ditt intag av Natriumoxibat Kalceks. Prata med sjukvårdspersonal angående andra eventuella frågor du har, och läs igenom bipacksedeln som kom tillsammans med flaskan med läkemedel.

1. Vad är Natriumoxibat Kalceks?

Natriumoxibat Kalceks innehåller den aktiva substansen natriumoxibat. Detta läkemedel verkar genom att stärka nattsömnen, men den exakta verkningsmekanismen är okänd.

Detta läkemedel används för att behandla narkolepsi med kataplexi hos vuxna. Narkolepsi är en sömnstörning som kan innefatta sömnanfall under den normalt vakna delen av dygnet, liksom kataplexi, sömnförlamning, hallucinationer och dålig sömn. Kataplexi är ett anfall av plötslig muskelsvaghet eller förlamning utan att förlora medvetandet, som svar på en plötslig känslomässig reaktion såsom vrede, rädsla, glädje, skratt eller överraskning.

2. Får jag dricka alkohol medan jag tar Natriumoxibat Kalceks?

Nej, du får inte dricka alkohol medan du tar Natriumoxibat Kalceks. Natriumoxibat Kalceks's effekter kan förstärkas och du kan uppleva nedsatt andning (andningsdepression) som kan vara dödlig. Du kan också uppleva nedsatt tankeförmåga eller förvirring.

3. Vilka allvarliga biverkningar har Natriumoxibat Kalceks?

Andningsbesvär (andningsdepression)

Natriumoxibat Kalceks kan påverka din andning. Om du har några andnings eller lungproblem bör du informera din läkare innan du tar Natriumoxibat Kalceks. Om du är överviktig har du också ökad risk för andningsdepression. Du bör inte dricka alkohol eftersom detta också kan öka risken för andningsdepression. Andningsdepression kan vara allvarlig och även dödlig.

Depression och självmordstankar

Om du känner dig nedstämd eller har några tankar på att skada dig själv medan du tar Natriumoxibat Kalceks bör du genast informera din läkare. Du bör också informera din läkare om du tidigare har drabbats av depression.

Sänkt medvetandegrad

Eftersom Natriumoxibat Kalceks verkar direkt på hjärnan orsakar det dåsighet och kan sänka din medvetandegrad. Detta kan leda till koma och kan vara dödligt. Det är viktigt att du inte dricker alkohol medan du tar Natriumoxibat Kalceks. Du bör inte ta några andra läkemedel som orsakar dåsighet. Du bör inte heller köra bil eller använda maskiner under minst 6 timmar efter att du tagit Natriumoxibat Kalceks.

Epileptiska anfall

Natriumoxibat Kalceks kan orsaka epileptiska anfall. Innan du tar Natriumoxibat Kalceks bör du tala om för din läkare om du har haft epileptiska anfall tidigare.

Beroende/missbruk/felanvändning

Den aktiva substansen i Natriumoxibat Kalceks är gamma-natriumoxibat (GHB). GHB är en substans som har missbrukats och felanvänts. Din läkare kommer därför att specifikt fråga dig om du har missbrukat läkemedel tidigare. Missbruk och felanvändning av Natriumoxibat Kalceks är farligt och kan leda till döden.

Dessa är inte alla Natriumoxibat Kalceks's biverkningar. Fler biverkningar anges i avsnitt 4 om bipacksedeln. Tala med din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar.

4. Är Natriumoxibat Kalceks säkert att använda tillsammans med andra läkemedel?

Som med alla andra läkemedel är det väldigt viktigt att du berättar för din läkare om andra läkemedel som du tar, inklusive icke-receptbelagda läkemedel. Natriumoxibat Kalceks bör inte användas i kombination med läkemedel som orsakar dåsighet eller med läkemedel såsom narkotiska smärtstillande medel som kan orsaka dämpning av det centrala nervsystemet. Tala om för din läkare om du tar läkemedel som ökar aktiviteten i det centrala nervsystemet, antidepressiva läkemedel, eller läkemedel som omsättes på liknande sätt i kroppen, såsom valproat, topiramat, fenytoin eller etosuximid. Be sjukvårdspersonal om ett Natriumoxibat Kalceks Patientkort som du kan bära med dig för att påminna dig om hur Natriumoxibat Kalceks ska användas. Visa detta kort för alla läkare som behandlar dig så att de vet att du tar Natriumoxibat Kalceks, särskilt om de skriver ut läkemedel till dig.

5. Vad ska jag göra om jag råkar ta mer än den förskrivna dosen?

Se till att genast söka akut hjälp om du tar för mycket Natriumoxibat Kalceks (överdos).

Att ta för mycket Natriumoxibat Kalceks kan orsaka symptom såsom agitation, förvirring, försämrad rörlighet, försämrad andning, suddig syn, överdriven svettning, huvudvärk, kräkningar och sänkt medvetandegrad vilket kan leda till koma och epileptiska anfall. Det underlättar för sjukvårdspersonalen att ta hand om dina symptom om du tar med dig den märkta läkemedelsflaskan, även om den är tom.

6. Vad händer om jag plötsligt slutar att ta Natriumoxibat Kalceks?

Om du plötsligt slutar att ta Natriumoxibat Kalceks kan du uppleva abstinens. Du kanske märker att de kataplektiska anfällen återkommer och, i ovanliga fall kan du drabbas av sömnlöshet, huvudvärk, ångest, yrsel, sömnsvårigheter, trötthet, hallucinationer och onormala tankar.