

PATIENTINFORMATIONSKORT

Dabigatran Etexilate Zentiva kapslar

- Du/vårdaren ska alltid ha med detta patientinformationskort.
- Se till att det är den senaste versionen

Bästa patient/vårdare av en pediatrik patient

Du/ditt barn har nu börjat behandlas med Dabigatran etexilate Zentiva (dabigatran etexilat). För att kunna använda dabigatran etexilate Zentiva på ett säkert sätt bör du läsa den viktiga informationen i bipacksedeln.

Detta informationskort innehåller viktig information om din/ditt barns behandling. Se därför till att du/ditt barn alltid har med det. Informera vårdpersonal om att du/ditt barn använder dabigatran etexilate Zentiva.

Information om Dabigatran etexilate Zentiva för patienter/vårdare av pediatrika patienter

Om din/ditt barns behandling

- Dabigatran etexilate Zentiva tunnar ut blodet. Det används för att behandla befintliga blodproppar eller förhindra att farliga blodproppar bildas.
- Följ din/ditt barns läkares anvisningar när du tar dabigatran etexilate Zentiva. Hoppa aldrig över en dos och sluta inte ta dabigatran etexilate Zentiva utan att först prata med din/ditt barns läkare.
- Informera din/ditt barns läkare om alla läkemedel som du/ditt barn tar.
- Informera läkaren om att du/ditt barn tar dabigatran etexilate Zentiva innan du/ditt barn ska genomgå en operation eller andra ingrepp.
- Dabigatran etexilate Zentiva kapslar kan tas med eller utan mat. Kapseln ska sväljas hel med ett glas vatten. Kapseln får inte brytas sönder eller tuggas och kornen får inte tömmas ut från kapseln.

När du bör uppsöka läkare

- Blödningsrisken kan öka när du tar dabigatran etexilate Zentiva. Kontakta genast läkare om du/ditt barn upplever tecken och symtom på blödning såsom svullnad, obehag, ovanlig smärta eller huvudvärk, yrsel, blekhet, svaghet, ovanliga blåmärken, näsblod, blödning i tandköttet, ovanligt långvarig blödning vid skärsår, onormalt mensflöde eller blödning från slidan, blod i urinen som kan vara rosa eller brun, röd/svart avföring, blodiga upphostningar, blodiga kräkningar eller kräkningar som liknar kaffesump.
- Vid fall eller skada, framför allt om huvudet skadas, kontakta genast läkare.

- Sluta inte att ta dabigatran etexilate Zentiva utan att först prata med din/ditt barns läkare, om du/ditt barn upplever halsbränna, illamående, kräkningar, magbesvär, uppsvälld mage eller smärta i övre delen av buken.

Information om Dabigatran etexilate Zentiva för vårdpersonal

- Dabigatran etexilate Zentiva är ett oralt antikoagulantium (direkt trombinhämmare).
- Behandlingen med dabigatran etexilate Zentiva kan behöva avbrytas inför en operation eller annat ingrepp.
- Om större blödningshändelser uppstår måste behandlingen med dabigatran etexilate Zentiva avbrytas omedelbart.
- Ett specifikt reverserande läkemedel idarucizumab finns tillgängligt för vuxna patienter. Effekt och säkerhet för det specifika reverserande läkemedlet, idarucizumab, har inte fastställts hos pediatrika patienter. För mer information och ytterligare råd om hur den antikoagulerande effekten av dabigatran etexilate Zentiva kan motverkas, se produktresumén för dabigatran etexilate Zentiva och idarucizumab.
- Dabigatran etexilate Zentiva utsöndras huvudsakligen via njurarna; adekvat diures måste upprätthållas. Dabigatran etexilate Zentiva kan dialyseras.

Fyll i denna del eller be din/ditt barns läkare att göra det Patientinformation

Patientens namn

Födelsedatum

Indikation för antikoagulation

Dos av Dabigatran etexilate Zentiva