


Patientkort

Detta patientkort uppfyller villkoren i godkännandet för försäljning.

Version 8.0, Juli 2025, 731-SE-2500001



VIKTIG information för patienter

Bär alltid det här kortet med dig för att informera hälso- och sjukvårdspersonal om att du behandlas med YERVOY® (ipilimumab) ensamt.



Ipilimumab kan orsaka allvarliga eller till och med livshotande biverkningar som kan påverka olika delar av kroppen.



Om du får tecken eller symtom, tala genast om det för din läkare.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR



Mage och tarm

Diarré (vattnig, lös eller mjuk avföring), blodig eller mörkfärgad avföring, fler tarmtömningar än vanligt, smärta eller ömhet i mage eller buk, illamående eller kräkningar.



Ögon

Röda ögon, ögonsmärta, synproblem eller dimsyn.



Hormon-körtlar

Snabb hjärtfrekvens, ökad svettning, viktuppgång eller viktnedgång, frossa, håravfall, förstoppning, mörkare röst, feber, trötthetskänsla, huvudvärk, yrsel eller svimning, överdriven hunger eller törst, förändrad urineringsfrekvens eller beteendeförändringar (såsom minskad sexlust, irritabilitet eller glömska).



Lever

Gulfärgade ögon eller hud (gulsot), smärta på höger sida i magtrakten, mörk urin eller blödningar.



Lungor

Andnöd, hosta eller bröstsmärta.



Nerver

Muskelsvaghet, domningar eller stickningar i ben, armar eller ansikte, yrsel, medvetslöshet eller svårigheter att vakna.



Hud

Hudutslag med eller utan klåda, torr hud, blåsor och/eller flagnande hud, munsår, svullnad i ansiktet eller lymfkörtlarna.

Andra viktiga biverkningar

Allvarliga infusionsreaktioner:

- Eventuella reaktioner i samband med infusionen av ipilimumab i blodbanan inträffar vanligen under infusionen eller inom 24 timmar.
- Tala omedelbart om för din läkare eller sjuksköterska om du får något av följande symtom under infusionen av ipilimumab: frossa eller skakningar, klåda eller utslag, rodnad, andningssvårigheter, yrsel, feber eller svimningskänsla.

VIKTIGT

- Berätta för din läkare om alla tidigare sjukdomar.
- Tidig behandling av biverkningar minskar risken för att behandlingen med ipilimumab tillfälligt eller permanent måste avbrytas.
- Tecken och symtom som kan verka lindriga kan snabbt bli värre om de inte behandlas.
- Försök **INTE** behandla dessa symtom själv.
- Tecken och symtom kan vara fördröjda och kan uppkomma veckor till månader efter din sista ipilimumab-infusion.

För mer information läs bipacksedeln för ipilimumab på www.fass.se och www.ema.europa.eu eller ring Medicinsk Information på 08-585 07 304.

VIKTIG information för hälso- och sjukvårdspersonal

- Denna patient behandlas med ipilimumab ensamt.
- Immunrelaterade biverkningar kan uppträda när som helst under behandlingen eller månader efter avslutad behandling.
- Tidig diagnos och lämplig behandling är avgörande för att minimera livshotande komplikationer.
- Konsultation av en onkolog eller övrig specialist kan vara till hjälp vid hantering av organspecifika immunrelaterade biverkningar.
- Hälso- och sjukvårdspersonal kan hitta mer information i produktresumén för YERVOY® som finns på www.fass.se och www.ema.europa.eu eller ringa Medicinsk Information på 08-585 07 304 för mer information.

Hälso- och sjukvårdspersonalen som behandlar patienten med ipilimumab ska fylla i avsnittet "Kontaktuppgifter till min läkare" i detta Patientkort.

Kontaktuppgifter till min läkare (som förskrivit ipilimumab)

Läkarens namn: _____

Telefonnummer under kontorstid: _____

Telefonnummer efter kontorstid: _____

Mina kontaktuppgifter

Mitt namn och mitt telefonnummer: _____

Kontaktinformation vid en nödsituation (namn och telefonnummer): _____