

Vad bör jag veta om Rivaroxaban Avansor? ♦ Rivaroxaban Avansor gör blodet tunnare, vilket förhindrar bildning av farliga blodproppar. ♦ Rivaroxaban Avansor måste tas exakt så som din läkare ordinerat. För att få ett optimalt skydd mot blodproppar ska du aldrig hoppa över en dos . ♦ Du ska inte sluta ta Rivaroxaban Avansor utan att först tala med din läkare, eftersom risken för blodproppar kan öka. ♦ Tala om för din vårdgivare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, innan du påbörjar behandling med Rivaroxaban Avansor.	♦ Tala om för din vårdgivare att du tar Rivaroxaban Avansor innan kirurgi eller andra ingrepp. När ska jag be om råd från min läkare? När man tar blodförtunnande medel som Rivaroxaban Avansor är det viktigt att känna till eventuella biverkningar. Blödningar är den vanligaste biverknin-gen. Påbörja inte behandling med Rivaroxaban Avansor om du vet att du har risk för blödningar, utan att först diskutera detta med din läkare. Tala genast om för din läkare om du har fått några tecken eller symtom på blödning enligt nedan: ♦ smärta ♦ svullnad eller obehag ♦ huvudvärk, yrsel eller svaghet	♦ ovanligt många blåmärken, näsblöd-ning, blödningar från tandköttet eller från sår som tar lång tid att sluta blöda ♦ menstruation eller vaginal blödning som är kraftigare än normalt ♦ blod i urinen som kan vara rosa- eller brunfärgad, röd eller svart avföring ♦ upphostningar med blod, eller kräkningar med blod eller kaffesumpsliknande kräkningar. Hur ska jag ta Rivaroxaban Avansor? ♦ För att få ett optimalt skydd, ska Rivaroxaban Avansor - 2,5 mg tas med eller utan mat - 10 mg tas med eller utan mat - 15 mg tas med mat - 20 mg tas med mat.	Information för vårdgivare: ♦ INR-test ska inte användas eftersom det inte är ett tillförlitligt mått på den antikoagulatoriska aktiviteten hos Rivaroxaban Avansor.	PATIENTKORT Rivaroxaban Avansor 2,5 mg Rivaroxaban Avansor 10 mg Rivaroxaban Avansor 15 mg Rivaroxaban Avansor 20 mg ♦ Bär alltid detta kort med dig ♦ Ta fram kortet varje gång du söker behandling hos läkare eller tandläkare
Jag får antikoagulationsbehandling med Rivaroxaban Avansor (rivaroxaban). Namn: Adress: Födelsedatum: Vikt:	Andra läkemedel / medicinska tillstånd: I akuta situationer, vänligen kontakta: Läkarens namn: Läkarens telefonnummer: Läkarens stämpel:	Vänligen kontakta också: Namn: Telefonnummer: Relation:	Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. I Finland webbplats: www.fimea.fi Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea PB 55 00034 Fimea I Sverige Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala www.lakemedelsverket.se	Samt Avansor Pharma Oy Teknikvägen 14 02150 Esbo Finland info@avansorpharma.fi Version 3.0 Godkänt av Fimea 18.12.2020 Godkänt av Läkemedelsverket 30.11.2023 ARTDB027427P 02.10.2024

POTILASKORTTI Rivaroxaban Avansor 2,5 mg Rivaroxaban Avansor 10 mg Rivaroxaban Avansor 15 mg Rivaroxaban Avansor 20 mg ♦ Pidä tämä kortti aina mukanas ♦ Näytä tämä kortti aina lääkärille tai hammaslääkärille ennen hoitotoimenpiteitä  AVANSOR PHARMA	Mitä minun tulisi tietää Rivaroxaban Avansor-valmisteesta? ♦ Rivaroxaban Avansor ohentaa verta ja estää siten vaarallisten veritulppien muodostumisen. ♦ Ota Rivaroxaban Avansor-valmistetta juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Parhaan suojan veritulppia vastaan saat, kun otat sinulle määrätyt annokset säännöllisesti. ♦ Älä lopeta Rivaroxaban Avansor-valmisteen ottamista keskustelematta ensin lääkärin kanssa, sillä lopettaminen saattaa lisätä veritulpan riskiä.	♦ Ennen kuin aloitat ottamaan Rivaroxaban Avansor-valmistetta, kerro lääkärille kaikista muista lääkevalmisteista, joita parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai aiot alkaa ottaa. ♦ Kerro aina että käytät Rivaroxaban Avansor-valmistetta ennen kuin sinulle tehdään kirurginen tai muu toimenpide. Milloin tarvitsen lääkärin apua? Rivaroxaban Avansor-valmisteen kaltaista verenhennuslääkettä käytettäessä on tärkeää olla tietoinen sen mahdollisista haittavaikutuksista. Yleisin haittavaikutus on verenvuoto. Jos tiedät, että sinulla on verenvuotoriski, älä ala käyttää Rivaroxaban Avansor-valmistetta keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa.	Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla ilmenee jotain seuraavista verenvuodon merkeistä tai oireista: ♦ kipua ♦ turvotusta tai epämukavuutta ♦ päänsärkyä, huimausta tai heikotusta ♦ epänormaalia mustelmien muodostumista, nenä- tai ienverenvuotoa tai jos verenvuodon tyrehtyminen kestää poikkeuksellisen kauan ♦ tavallista runsaamp
--	--	--	---