

Graviditetspreventionsprogram - Riskmedvetandeformulär

Riskmedvetandeformulär för att patienten ska vara fullständigt informerad om säker användning av Lenalidomid Medical Valley

Detta Riskmedvetandeformulär är avsett att stödja dig vid patientrådgivning innan patienten påbörjar behandling med lenalidomid för att säkerställa att läkemedlet används på ett säkert och korrekt sätt.

Syftet med Riskmedvetandeformuläret är att skydda patienter och eventuella foster genom att säkerställa att patienterna är fullständigt informerade om och förstår risken för teratogenicitet och andra biverkningar som förknippas med användningen av lenalidomid.

Det är inte ett avtal och fritar inte någon från sitt ansvar med avseende på säker användning av produkten och förebyggande av fosterexponering.

Patientuppgifter

Fyll i detta formulär med STORA BOKSTÄVER.

Patientens förnamn	
Patientens efternamn	
Patientens underskrift	
Datum för rådgivning	

Förskrivarens uppgifter

Fyll i detta formulär med STORA BOKSTÄVER.

Förskrivarens förnamn	
Förskrivarens efternamn	
Förskrivarens underskrift	
Datum	

Välj den kolumn som är lämplig för patientens riskkategori och hänvisa till den rådgivningsinformation som tillhandhålls

Har du informerat din patient:	Manliga patienter	Kvinnor som är infertila*	Kvinnor som är fertila
1) Att det är viktigt att undvika fosterexponering		E / T	
2) Att hon inte får ta lenalidomid om hon är gravid eller planerar att bli det	E / T	E / T	
3) Så att hon förstår att det är viktigt att undvika lenalidomid under graviditet och att använda effektiva preventivmedel utan avbrott, minst 4 veckor innan behandlingen påbörjas, under hela behandlingen och i minst fyra veckor efter avslutad behandling	E / T	E / T	
4) Att hon ska informera följande läkare om hon behöver byta eller avsluta sin preventivmetod: a) läkaren som förskriver hennes preventivmedel om att hon tar lenalidomid b) läkaren som förskriver lenalidomid om att hon har slutat använda eller bytt sin preventivmetod	E / T	E / T	
5) Att det är viktigt med graviditetstester (dvs. före behandling) minst var fjärde vecka under behandling och efter behandling	E / T	E / T	
6) Att det är viktigt att omedelbart avsluta lenalidomid vid misstanke om graviditet	E / T	E / T	
7) Att det är viktigt att omedelbart kontakta sin läkare vid misstanke om graviditet	E / T	E / T	
8) Att inte dela läkemedlet med någon annan person			
9) Att inte ge blod under behandlingen (inklusive under dosavbrott) och i minst 7 dagar efter utsättning av lenalidomid			
10) Att lämna tillbaka de oanvända kapslarna till apoteket efter avslutad behandling			
11) Att lenalidomid återfinns i sädesvätska, så det finns ett behov av att använda kondom om sexpartnern är gravid eller kan bli gravid och inte använder ett effektivt preventivmedel (även om mannen har genomgått vasektomi)		E / T	E / T
12) Att han omedelbart ska informera sin behandlande läkare om hans partner blir gravid och alltid använda kondom		E / T	E / T
13) Att han inte ska donera sädesvätska under behandling (inklusive under dosavbrott) och i minst 7 dagar efter utsättning av lenalidomid		E / T	E / T

*Se informationsbroschyr för hälso- och sjukvårdspersonal för kriterier för att avgöra om en patient är en infertil kvinna.

Kan du bekräfta att din patient:	Manliga patienter	Kvinnor som är infertila*	Kvinnor som är fertila
1) Vid behov remitterats för rådgivning om preventivmetoder?	E / T	E / T	
2) Är kapabel till att tillämpa en preventivmetod?		E / T	
3) Har samtyckt till att genomgå graviditetstester minst var fjärde vecka förutom vid bekräftad tubarsterilisering?	E / T	E / T	
4) Hade ett negativt graviditetstest innan behandlingen påbörjades även vid absolut och kontinuerlig avhållsamhet?	E / T	E / T	

*Se informationsbroschyr för hälso- och sjukvårdspersonal för kriterier för att avgöra om en patient är en infertil kvinna.

Behandling av fertila kvinnor kan inte inledas förrän patienten har använt minst en effektiv preventivmetod i minst 4 veckor innan behandlingen påbörjas eller förbinder sig till absolut och kontinuerlig avhållsamhet och graviditetstestet är negativt!