

FINGOLIMOD

PATIENTKORT MED GRAVIDITETSINFORMATION Fingolimod Zentiva (fingolimod)

INNAN BEHANDLING MED FINGOLIMOD PÅBÖRJAS

- **Fingolimod får inte användas av gravida kvinnor, kvinnor som försöker att bli gravida eller av fertila kvinnor (inklusive tonårsflickor) som inte använder en effektiv preventivmetod.**
- Fingolimod kan skada det ofödda barnet (läkemedlet sägs vara 'teratogent'). Innan du börjar med behandlingen med fingolimod kommer läkaren att informera dig om risken för fosterskada och de åtgärder du måste vidta för att undvika att bli gravid medan du tar fingolimod.
- Din läkare kommer att be dig lämna ett graviditetstest som bekräftas vara negativt innan behandlingen med fingolimod påbörjas.
- Din läkare kommer att informera dig om att du måste använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och i två månader efter avslutad behandling. Tala med din läkare om vilka preventivmetoder som är effektivast för dig.
- Läs patientguiden om fingolimod som du får av din läkare.

MEDAN DU TAR FINGOLIMOD

- Du får inte bli gravid under behandlingen med fingolimod eller inom två månader efter avslutad behandling.
- För att undvika att bli gravid måste du använda en effektiv preventivmetod medan du tar fingolimod samt i två månader efter avslutad behandling.
- Din läkare kommer att be dig lämna ett graviditetstest med lämpliga intervaller under behandlingen.
- Din läkare kommer regelbundet ge dig information allvarliga risker för fosterskada under behandling med fingolimod.
- **Tala genast med din läkare om du blir eller vill bli gravid eftersom din läkare då kommer att avsluta din behandling med fingolimod.**
- Om du blir gravid kommer din läkare att ge dig råd om de allvarliga riskerna för det ofödda barnet och du bör remitteras till specialistmödravård.

EFTER AVSLUTAD BEHANDLING MED FINGOLIMOD

- Informera din läkare omedelbart om du tycker att din MS försämras (till exempel svaghet eller synförändringar) eller om du märker några nya symptom efter att du har avslutat behandlingen med fingolimod på grund av en graviditet.

- Du måste använda en effektiv preventivmetod i två månader efter avslutad behandling med fingolimod eftersom det tar lång tid för fingolimod att lämna kroppen.

RAPPORTERING AV BIVERKNINGAR

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln som medföljer förpackningen. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket via:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.