

© 2020 Bristol Myers Squibb Company.
All rights reserved.

Granskat av Läkemedelsverket:
Augusti 2020

Lokalt referensnummer: **ONC-SE-2200101**

Version 10.0 Augusti 2020

Kontaktuppgifter till min läkare

(som förskrivit OPDIVO® eller
OPDIVO® i kombination med
YERVOY®)

Läkarens namn:

Telefonnummer arbete:

Telefonnummer efter kontorstid:

Mina kontaktuppgifter

Mitt namn:

Mitt telefonnummer:

Kontaktinformation vid
en nödsituation (namn och
telefonnummer):



VIKTIG Information för hälso- och sjuk- vårdspersonal

- Denna patient behandlas med **OPDIVO (nivolumab)** eller **OPDIVO i kombination med YERVOY (ipilimumab)**.
- Immunrelaterade biverkningar kan uppträda när som helst under behandlingen eller månader efter avslutad behandling.
- Tidig diagnos och lämplig behandling är avgörande för att minimera livshotande komplikationer.
- Att konsultera en specialist inom onkologi, hematologi eller lungmedicin kan vara till hjälp

vid hantering av organspecifika immunrelaterade biverkningar.

- Hälso- och sjukvårdspersonal kan hitta mer information i produktresumén för OPDIVO® som finns på **fass.se** och **www.ema.europa.eu** eller ringa Medicinsk Information på telnr: **08-585 07 304**. Patientkortet finns för nedladdning eller beställning på **www.immunonkologi.se/materialbeställning**.

Hälso- och sjukvårdspersonal som behandlar patienten med OPDIVO® eller OPDIVO® i kombination med YERVOY® ska fylla i avsnittet **“Kontaktuppgifter till min läkare”** i detta Patientkort.

OPDIVO® (nivolumab)

Patientkort

 Bristol Myers Squibb®

Viktig information till dig som får behandling

Bär alltid med dig detta kort för att kunna informera hälso- och sjukvårdspersonal att du är under behandling med OPDIVO eller OPDIVO i kombination med YERVOY (ipilimumab).



Om du upplever biverkningar av behandlingen eller har andra symtom, kontakta din läkare omedelbart.



VIKTIGT

Behandling med OPDIVO® kan öka risken för allvarliga eller livshotande immunrelaterade biverkningar som kan påverka olika delar av kroppen, till exempel:

BRÖSTKORG (hjärta och lungor)
andningssvårigheter, hosta, väsande andning, bröstsmärta, oregelbunden hjärtrytm, hjärtklappning (ökad medvetenhet om dina hjärtslag)

MAGE (magsäck och tarmar)
diarré (vattnig, mjuk eller lös avföring), blod eller slem i avföringen,

mörkfärgad avföring, smärta eller ömhet i mage eller buk

LEVER

gulfärgade ögon eller hud (gulсот), smärta på höger sida av magtrakten

NJURAR

förändring i mängd och/eller frekvens av urin

HORMONPRODUCERANDE KÖRTLAR (inklusive diabetes)

huvudvärk, dimsyn eller dubbelseende, utmattning (trötthet), vikt-förändring, beteendeförändringar (t.ex. minskad sexlust, irritation eller glömska), överdriven törst, ökad aptit med viktförlust, svaghet, dåsighet, depression, irritation, allmän sjukdomskänsla, förändring i mängd och/eller frekvens av urin

HUD

utslag, klåda, blåsor och/eller hudfjällning (potentiellt livshotande), sår, torr hud, hudknutor

ÖVRIGT

svaghet, utmattning (trötthet), minskad aptit, illamående, kräkning, stickningar eller domningar i armar och ben, svårigheter att gå, feber, svullna lymfkörtlar, huvudvärk, krampanfall, nackstelhet, förvirring, dåsighet, muskelsmärta, stelhet, mörk urin, smärta eller rodnad i ögat, dimsyn eller andra synproblem



VIKTIGT

- Berätta för din läkare om tidigare medicinska tillstånd, inklusive om du genomgått stamcellstransplantation med donatorstamceller (allogen stamcellstransplantation).
- Tidig bedömning och hantering av biverkningar, av din läkare, minskar risken för att behandlingen med OPDIVO (nivolumab) eller OPDIVO i kombination med YERVOY (ipilimumab) måste stoppas tillfälligt eller permanent.

- Symtom som tycks vara milda kan snabbt förvärras om de inte behandlas.
- Försök **INTE** att behandla dessa symtom på egen hand.
- Tecken och symtom kan ibland uppträda sent, det vill säga veckor eller månader efter din sista dos.

För mer information, se OPDIVO bipacksedel som medföljer förpackningen samt finns på fass.se och www.ema.europa.eu eller ring Medicinsk Information på telnr: **08-585 07 304**