

CHECKLISTA FÖR FÖRSKRIVARE:

Påbörjande och uppföljning av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva för profylax före exponering (PrEP)

Instruktioner: Fyll i checklistan vid varje besök och lägg in i individens vårdjournal.

Jag har genomfört följande innan förskrivning av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva för profylax före exponering (PrEP)-indikation för en individ som ska börja ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva för PrEP-indikation:

Inledande utvärdering

- ☐ Genomförde riskevaluering av en oinfekterad individ
- ☐ Bekräftade negativt HIV-1-test omedelbart innan påbörjande av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva för PrEP-indikation genom att använda ett kombinerat antigen/antikropp-test
 - Om kliniska symtom förenliga med en akut viral infektion är närvarande och nylig (<1 månad) exponering misstänks, senarelägg påbörjande av PrEP minst 1 månad och ombekräft HIV-1-status.
- ☐ Utförde screening för sexuellt överförbara infektioner, såsom syfilis och gonorré
- ☐ Då tillämpligt, utvärderade risk/nytta för kvinnor som kan vara gravida eller kan vilja bli gravida
- ☐ Utförde ett HBV-screeningstest
- ☐ Erbjud HBV-vaccinering då passande
- ☐ Innan påbörjande, bekräftade uppskattad kreatininclearance (CrCl)

Oinfekterade vuxna
CrCl >80 ml/min. Om CrCl <80 ml/min, använd bara om nyttan övervägde risken.
Inte rekommenderad om CrCl är <60 ml/min.

Oinfekterade ungdomar
Borde inte användas om CrCl <90 ml/min/1,73 m²
- ☐ Bekräftade att individen i risk inte tar andra HIV-1- eller HBV-mediciner
- ☐ Bekräftade att individen i risk inte tar eller inte nyligen har tagit nefrotoxiska läkemedel. Om samtidig användning av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva och nefrotoxiska medel är oundviklig, bör njurfunktion kontrolleras varje vecka.

Rådgivning

- ☐ Gav råd att Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva för PrEP-indikation endast bör användas som en del av en omfattande förebyggande strategi och undervisade om konsekvent säker sex och rätt användning av kondomer
- ☐ Gav råd om viktigheten av att hålla sig till doseringsschemat
- ☐ Rekommenderade individen att lägga till en påminnelse på sin mobiltelefon eller någon annan apparat som kan varsla hen när det är dags att ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva
- ☐ Gav råd om vikten av planerad uppföljning, innefattande regelbundna HIV-1-screeningstester (t.ex. minst var tredje månad), medan man tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva för PrEP-indikation för att bekräfta HIV-1-negativ-status
- ☐ Diskuterade vikten av att avbryta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva för PrEP-indikation om en serokonversion har inträffat, för att minska utveckling av resistent HIV-1-varianter
- ☐ Diskuterade vikten av individens kännedom om deras HIV-1-status och, om möjligt, den av deras partners
- ☐ Diskuterade vikten av screening för sexuellt överförbara infektioner, såsom syfilis och gonorré, vilka kan främja HIV-1-överföring
- ☐ Diskuterade kända säkerhetsrisker med användning av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva för PrEP-indikation
- ☐ Erbjud patientmaterial till individ i risk och granskade dessa med dem

Uppföljning

- ☐ Utförde regelbunden HIV-1-screening (t.ex. minst var tredje månad)
- ☐ Kontrollerade individens rapporterade följsamhet (t.ex. från kalendern på påminnelsekortet)
- ☐ Omvärderade individen vid varje besök för att försäkra huruvida den återstår i en hög risk av HIV-1-infektion. Risk av HIV-1-infektion bör balanseras mot de potentiella njur- och benvävnads effekterna med en långvarig användning av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva
- ☐ Avbröt Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva för PrEP om serokonversion har inträffat
- ☐ Utförde screening för sexuellt överförbara infektioner, såsom syfilis och gonorré
- ☐ Identifierade potentiella biverkningar
- ☐ Utförde njurkontroll som rekommenderat
- ☐ Hos individer utan njurriskfaktorer, ska njurfunktionen (kreatininclearance och serumfosfat) kontrolleras efter 2 till 4 veckors användning, efter 3 månaders användning och var 3:e till 6:e månad därefter. Hos individer med hög risk för njurförsämring, krävs tätare kontroll av njurfunktionen.
- ☐ Utförde ett HBV-screeningstest (om tidigare testat negativt för HBV eller inte har fått en HBV-vaccinering)
- ☐ Registrerade nästa uppföljningstid och HIV-1-screeningstestdatum på påminnelsekortet och gav detta till individen