

# REBLOZYL® (luspatercept) PATIENTKORT

*Detta patientkort är till för fertila kvinnor.*

## **Till patienter:**

Reblozyl (luspatercept) ska inte användas under graviditet och ska ha avslutats minst tre (3) månader innan du försöker bli gravid. Luspatercept kan skada det ofödda barnet.

Använd inte luspatercept om du är gravid eller ammar, eller kan bli gravid och inte använder minst en mycket effektiv preventivmetod.

## **Före behandlingsstart:**

- Du måste lämna ett negativt graviditetstest som bekräftas av din läkare.
- Din läkare kommer att gå igenom effektiva preventivmetoder med dig. Du måste använda minst en mycket effektiv preventivmetod under tiden som du använder luspatercept och i minst tre (3) månader efter avslutad behandling.

## **Under och efter behandlingen:**

Graviditetstest måste upprepas med lämpliga intervall under behandlingen med luspatercept.

Berätta omedelbart för din läkare om du blir gravid eller tror att du kan vara gravid under behandlingen med luspatercept och under tre (3) månader efter avslutad behandling med luspatercept.

För mer information, se REBLOZYL bipacksedel:  
[www.fass.se](http://www.fass.se) eller [www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu)

Du hittar aktuellt utbildningsmaterial på  
[www.fass.se](http://www.fass.se)

---

Biverkningar kan rapporteras till Läkemedelsverket:  
[www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

För mer information, kontakta Bristol Myers Squibb  
Medicinsk Information: +46 8 58507304 eller  
[medinfo.sweden@bms.com](mailto:medinfo.sweden@bms.com)

---

**Jag har blivit ordinerad behandling med luspatercept.**

**Kontaktuppgifter till min läkare** (förskrivare):

Läkarens namn:

Mottagning:

Mottagningens telefonnummer:

---

*För mer information till hälso- och  
sjukvårdspersonal, se REBLOZYL  
produktresumé: [www.fass.se](http://www.fass.se),  
[www.lakemedelsverket.se/lakemedelsfakta](http://www.lakemedelsverket.se/lakemedelsfakta)  
eller [www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu)*