

REBLOZYL[®]
(luspatercept)

PATIENTKORT

(För fertila kvinnor)

Version 4, 2007-SE-2500003, Aug 2025

Patientinformation

REBLOZYL® (luspatercept) ska inte användas under graviditet och ska ha avslutats minst 3 månader innan du blir gravid. REBLOZYL kan skada det ofödda barnet.

Använd inte REBLOZYL om du är gravid eller ammar, eller kan bli gravid och inte använder minst en mycket effektiv preventivmetod.

Innan du börjar behandlingen med REBLOZYL:

1. Du måste lämna ett negativt graviditetstest som bekräftas av din läkare.
 2. Du måste diskutera effektiva preventivmetoder med din läkare och använda minst en mycket effektiv preventivmetod under tiden som du använder REBLOZYL och i minst 3 månader efter avslutad behandling.
- Graviditetstest måste upprepas med lämpliga intervall.
 - Berätta omedelbart för din läkare om du blir gravid eller tror att du kan vara gravid under behandlingen med REBLOZYL och under 3 månader efter avslutad behandling med REBLOZYL.

Kontaktuppgifter till din läkare finns på baksidan av detta kort.

Mer information om effekter och biverkningar av REBLOZYL finns i bipacksedeln, som även går att läsa på fass.se (välj ingång för Allmänhet).

För ytterligare information eller för att få en kopia av detta dokument, vänligen kontakta medinfo.sweden@bms.com eller besök fass.se (välj ingång för Allmänhet, sök efter REBLOZYL, klicka på "Viktig patientinformation").

Jag tar REBLOZYL® på recept

Viktiga kontaktuppgifter

Min läkare som förskrivit REBLOZYL:

Namn:

Läkarens telefonnummer till mottagningen:

Mottagningens adress:

.....