

Patientkort

Rivaroxaban Grindeks (rivaroxaban)

- ☐ **Rivaroxaban Grindeks 10 mg** (kryssruta för ikryssning av förskriven dos)
- ☐ **Rivaroxaban Grindeks 15 mg** (kryssruta för ikryssning av förskriven dos)
- ☐ **Rivaroxaban Grindeks 20 mg** (kryssruta för ikryssning av förskriven dos)

- **Bär alltid detta kort med dig**
- **Visa kortet varje gång du söker behandling hos läkare eller tandläkare**

Jag får antikoagulationsbehandling med Rivaroxaban Grindeks (rivaroxaban)

Namn:

Adress:

Födelsedatum:

Vikt:

Andra läkemedel/medicinska tillstånd:

I akuta situationer, vänligen kontakta:

Läkarens namn:

Läkarens telefonnummer:

Läkarens stämpel:

Vänligen kontakta också:

Namn:

Telefon:

Relation:

Information för vårdgivare

- INR-test ska inte användas eftersom det inte är ett tillförlitligt mått på den antikoagulatoriska aktiviteten hos Rivaroxaban Grindeks

Vad bör jag veta om Rivaroxaban Grindeks?

- Rivaroxaban Grindeks gör blodet tunnare, vilket förhindrar bildning av farliga blodproppar.
- Rivaroxaban Grindeks måste tas exakt så som din läkare ordinerat. För att få ett optimalt skydd mot blodproppar **ska du aldrig hoppa över en dos**.
- Du ska inte sluta ta Rivaroxaban Grindeks utan att först tala med din läkare, eftersom risken för blodproppar kan öka.
- Tala om för din vårdgivare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, innan du påbörjar behandling med Rivaroxaban Grindeks.
- Tala om för din vårdgivare att du tar Rivaroxaban Grindeks innan kirurgi eller andra invasiva ingrepp.

När ska jag be om råd från min läkare?

När man tar blodförtunnande medel såsom Rivaroxaban Grindeks är det viktigt att känna till eventuella biverkningar. Blödningar är den vanligaste biverkningen. Påbörja inte behandling med Rivaroxaban Grindeks om du vet att du har risk för blödningar, utan att först diskutera detta med din läkare. Tala genast om för din läkare om du har fått några tecken eller symtom på blödning enligt nedan:

- Smärta
- Svullnad eller obehag
- Huvudvärk, yrsel eller svaghet
- Ovanligt många blåmärken, näsblödning, blödningar från tandköttet eller från sår som tar lång tid att sluta blöda
- Menstruation eller vaginal blödning som är kraftigare än normalt
- Blod i urinen som kan vara rosa- eller brunfärgad, röd eller svart avföring
- Upphostningar med blod, eller kräkningar med blod eller kaffesumpsliknande kräkningar

Hur ska jag ta Rivaroxaban Grindeks?

- För att få ett optimalt skydd, ska Rivaroxaban Grindeks
 - 10 mg tas med eller utan mat
 - 15 mg tas med mat
 - 20 mg tas med mat